

Dexeno⁴⁰⁰₆₀₀

Dexibuprofeno 400 / 600 mg
Capletas recubiertas

Analgésico / Antiinflamatorio no esteroide.

COMPOSICIÓN

Cada capleta recubierta contiene:

Dexibuprofeno 400 ó 600 mg

Excipientes, c.s.p. 1 capleta recubierta

DESCRIPCIÓN

DEXENO® es un enantiómero dextro del ibuprofeno racémico con propiedades básicamente analgésicas. Que actúa, como todos los fármacos de su clase, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. El dexibuprofeno actúa de forma reversible como inhibidor competitivo de la actividad del COX-1 y COX-2, produciendo también efectos antiinflamatorios leves.

INDICACIONES

Tratamiento sintomático del dolor agudo o crónico de diverso origen.

Usos clínicos: Dolores post-traumáticos, post-quirúrgicos, estomatológicos, cefaleas, dismenorreas.

CONTRAINDICACIONES

No debe administrarse a pacientes con úlcera péptica activa o recurrente, colitis ulcerosa, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o renal grave, antecedentes alérgicos al ácido acetilsalicílico (aspirina) o a otros antiinflamatorios no esteroideos. No es recomendable la ingestión de bebidas alcohólicas si está tomando este medicamento.

EFFECTOS ADVERSOS

Como suele ocurrir con otros antiinflamatorios no esteroideos, ocasionalmente pueden aparecer síntomas como ardor o molestias abdominales, diarrea, vómitos, sangre en las heces, erupción cutánea, irritación de la mucosa bucal, irregularidades menstruales, edema periférico, disminución del volumen de orina. También suelen aparecer vértigos, nerviosismo e irritabilidad, síntomas dispépticos, constipación, anorexia, náuseas.

ADVERTENCIAS

Antes de usar este medicamento se deben considerar los siguientes aspectos: antecedentes alérgicos, historia de reacción alérgica al dexibuprofeno, a alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes.

• **No administrar dosis altas de ibuprofeno o dexibuprofeno a pacientes con patología cardiovascular grave como insuficiencia cardíaca (clasificación II-IV de New York Heart Association-NYHA), cardiopatía isquémica establecida, enfermedad arterial periférica o enfermedad cerebro vascular.**

• **Antes de iniciar tratamiento a largo plazo con ibuprofeno o dexibuprofeno, sobre todo si se requieren dosis altas, se deberán evaluar cuidadosamente los factores de riesgo cardiovascular asociados del paciente.**

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No se recomienda el uso de este medicamento durante estas etapas.

POBLACIONES ESPECIALES

Ancianos: Los ancianos son usualmente más sensibles al efecto de los antiinflamatorios no esteroideos que los adultos jóvenes, razón por la que se recomienda precaución.

Pacientes bajo procedimientos quirúrgicos: Antes de cualquier procedimiento quirúrgico (incluyendo cirugía dental) debe comunicarse al médico u odontólogo respecto al uso de este medicamento. Los fármacos del tipo

antiinflamatorios no esteroideos pueden aumentar la posibilidad de sangrado y agravar los episodios de sangrado durante y después de procedimientos quirúrgicos.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

Este medicamento no debe administrarse por más de una semana ni en combinación con otros fármacos de su tipo.

Niños: no existen estudios que avalen el uso de DEXENO® en menores de 18 años.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Han sido descritas interacciones con los siguientes medicamentos: diuréticos, hipotensores, corticoides, digoxina, fenitoína, litio, metotrexate, ácido acetilsalicílico, paracetamol, otros antiinflamatorios no esteroideos, suplementos de potasio, hipoglucemiantes orales (por ej.: clorpropamida, glibenclamida, tolbutamida) anticoagulantes, ácido valproico, cefamandol, cefoperazona, cefotetan, ciclosporina, sales de oro y plicamicina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

Mayores de 18 años:

La dosis se adecuará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente.

Como dosis media de orientación se aconseja: 1 capleta recubierta de 400 mg ó 600 mg cada 8 o cada 12 horas. Se recomienda no exceder la dosis de 1,200 mg por día. Administrar con precaución a mayores de 60 años y a pacientes hipertensos no controlados. Con la finalidad de reducir la aparición de eventuales trastornos gastrointestinales, se recomienda administrar el medicamento junto con las comidas.

Las capletas recubiertas deben tragarse sin masticar acompañadas de agua.

SOBREDOSIS E INGESTA ACCIDENTAL

En caso de sobredosis o la ingesta accidental de este medicamento, se recomienda la consulta inmediata a un servicio de urgencias, a fin de instaurar las medidas de soporte hemodinámicas necesarias, así como el monitoreo de las funciones hepáticas y del cuadro hematológico del paciente.

PRESENTACIONES

DEXENO® 400 mg: Caja conteniendo 10 y 50 capletas recubiertas.

DEXENO® 600 mg: Caja conteniendo 10 y 50 capletas recubiertas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Venta bajo prescripción médica.

Almacenar a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.



Elaborado por:
Laboratorios Sued, S.R.L.
Carretera La Isabela, Pantoja,
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 847
www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. Sans. Rep. Dom. Nos.:

Dexeno® 400 mg: 2008-1376

Dexeno® 600 mg: 2016-1285

Reg. Sans. Guatemala Nos.:

Dexeno® 400 mg: PF-48055-2017

Dexeno® 600 mg: PF-56060-2018

®Marca registrada.



0000