




DOLO FLENEX®

Diclofenac Sódico • Tiamina Clorhidrato
Piridoxina Clorhidrato • Cianocobalamina

Comprimidos recubiertos
Analgésico / Neurotropo

Composición	Comprimido recubierto
Diclofenac sódico	75 mg
Tiamina Clorhidrato (vit. B1)	50 mg
Piridoxina Clorhidrato (vit. B6)	100 mg
Cianocobalamina (vit. B12)	1 mg
Excipientes, c.s.p.	1 comprimido recubierto

PROPIEDADES

Los principios activos presentes en la fórmula proporcionan acciones analgésicas y antiinflamatorias, al tiempo que brindan acciones neurotropas.

La presencia de las vitaminas B1, B6 y B12 contenidas en esta formulación actúan sobre muchos mecanismos metabólicos; sin embargo, sus actividades predominantes las ejercen sobre las neuronas y en la transmisión de sus impulsos, razones por lo que se les ha dado en llamarlas vitaminas neurotropas.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

El Diclofenac Sódico contenido en este producto ofrece analgesia y efectos anti-inflamatorios; además, las vitaminas presentes en **Dolo Flenex®**, permiten un manejo racional de estados dolorosos en los que se sospeche o compruebe alguna etiopatogenia neuropática: lumbalgias, cervicalgias, braquialgias, radiculitis, neuropatías periféricas de diversa etiopatogenia (neuralgias faciales, neuralgia del trigémino, neuralgia intercostal, neuralgia herpética, neuropatía post-alcohólica, neuropatía diabética); así como también, en el síndrome del canal del carpo, fibromialgia, espondilitis, dolores secundarios a traumas y cirugías.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, policitemia vera, enfermedad temprana de Leber, gastritis, úlcus gastroduodenal, pacientes con antecedentes alérgicos al ácido acetil salicílico y sus derivados, discrasias sanguíneas, hemorragias e insuficiencia renal y hepática.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Contraindicado su uso durante estas etapas.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Algunos pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico o sus derivados, pueden presentar alergia cruzada al Diclofenac. En raras ocasiones han sido reportadas la ocurrencia de alergias a la Tiamina y a la Cianocobalamina, razones por las que deberá observarse especial cuidado en personas con antecedentes de este tipo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

Antes de iniciar la terapéutica con **Dolo Flenex®** en combinación con algún otro fármaco, el médico deberá ponderar las posibles interacciones medicamentosas propias de la combinación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

Adolescentes mayores de 12 años: un (1) comprimido recubierto de **Dolo Flenex®** una vez al día, o según considere el médico tratante.

Adultos: Un (1) comprimido recubierto de **Dolo Flenex®** cada 12 horas, o según considere el médico tratante.

SOBREDOSIS E INGESTA ACCIDENTAL

En caso de sobredosis e ingesta accidental, se recomienda la consulta inmediata con un servicio médico.

PRESENTACIÓN

Dolo Flenex® Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

Dolo Flenex® Caja conteniendo 100 comprimidos recubiertos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Su venta requiere prescripción médica.

Almacenar a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES

Consulte la Dirección Médica de Laboratorios Sued, S.R.L.

Tel.: (809) 682-4344 / fax: (809) 686-1010

E. Mail: dir.medica@suedfarma.com

www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. República Dominicana No.: 2005-0468

Reg. San. Guatemala No.: PF-56199



Elaborado por:

Laboratorios Sued, S.R.L.

Carretera La Isabela, Pantoja,

Santo Domingo, República Dominicana

Apartado Postal 847

www.labsued.com

® Marca registrada