

Ingredientes activos:

Cada 100 g contiene:

Diclofenac dietilamina.....1,16 g	Salicilato de metilo.....3 g
(Equivalente a 1 g de Diclofenac Sódico)	Mentol.....4 g
	Excipientes, c.s.p.100 g

Advertencia y precaución:

Usos durante el embarazo y la lactancia: No se recomienda su administración durante estas etapas.

Uso en niños menores de 12 años de edad: Consultar a su médico.

Si la aplicación de Ontol Gel tópico produce irritación local, suspenda su uso. No se debe aplicar en los ojos, vías nasales, ni en lesiones abiertas de la piel (heridas).

Indicaciones:

Ontol gel está indicado en procesos de dolor e inflamación, tales como: Dolor de espalda y cuello, dolores musculares, dolor en las rodillas, cadera, inflamación de los tendones, inflamación de los tejidos que están situados alrededor de las articulaciones, artritis, lesiones causadas por golpes (sin heridas externas), calambres, torcedura muscular, tensiones musculares. Disminuye la hinchazón y alivia el dolor en casos de inflamaciones traumáticas o reumáticas.

La mezcla de sus ingredientes activos estimula la circulación sanguínea mejorando el tono muscular y su movilidad.

PRECAUCION: USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE, EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Modo de aplicación:

Aplicar de 2 a 4 g de Ontol Gel en el área afectada, frotando suavemente hasta que no quede residuo aparente sobre la piel, repitiendo la aplicación de 3 a 4 veces al día.

Almacenar a una temperatura no mayor a 30°C, Protegido de la luz.

Libre venta.

Reg. Ind. No.:18055

Reg. San. Rep. Dom. No.: 2013-0543

Reg. San. Guatemala. No.: PF-51874

TU-00043



Elaborado por:

Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana
www.labsued.com

www.ontolgel.com

