



FICHE D'INFORMATION PRÉ-OPÉRATOIRE

Néphrostomie percutanée

Qu'est-ce qu'une néphrostomie percutanée ?

La néphrostomie percutanée est une technique mini-invasive réalisée par un radiologue interventionnel. Elle consiste à mettre en place un petit cathéter de drainage directement dans le rein à travers la peau.

Ce cathéter permet d'évacuer les urines lorsque leur écoulement normal vers la vessie est bloqué ou insuffisant. Les urines sont alors recueillies dans une poche de drainage située à l'extérieur du corps.

La néphrostomie peut être temporaire ou plus durable selon la cause de l'obstruction.

Pourquoi cet examen m'est-il proposé ?

Cette intervention vous est proposée car vous présentez une obstruction des voies urinaires empêchant l'écoulement normal des urines.

Les principales situations pouvant nécessiter une néphrostomie sont :

- Une compression des voies urinaires par une tumeur.
- Un calcul urinaire obstruant l'uretère.
- Un rétrécissement (sténose) et/ou une plaie de l'uretère.
- Une infection urinaire compliquée associée à une obstruction.
- Une altération de la fonction rénale liée à un obstacle sur les voies urinaires.

La néphrostomie permet de soulager rapidement le rein, de traiter une infection éventuelle et de préserver sa fonction.

Comment se déroule l'examen ?


Avant l'examen :

- Consultation d'anesthésie selon votre situation.
- Jeûne de 6 heures.
- Douche la veille et le matin.
- Vérification des analyses sanguines.



Pendant l'examen (30 à 60 minutes) :

L'intervention est réalisée sous guidage échographique et/ou scanographique, le plus souvent sous anesthésie locale. Un cathéter est placé dans les cavités rénales et relié à une poche de drainage.



Après l'examen

- Surveillance quelques heures.
- Urines parfois sanglantes les premiers jours.
- Douleurs modérées calmées par des antalgiques.
- Contrôle régulier du drainage.
- Retrait ou remplacement secondaire selon l'évolution.

Quels sont les risques ?

- Douleurs au point de ponction.
- Sang dans les urines.
- Saignement ou hématome.
- Infection urinaire.
- Déplacement ou obstruction du cathéter.
- Exceptionnellement, lésion d'un organe voisin ou nécessité d'un geste complémentaire.



**Hôpital
Pitié-Salpêtrière
AP-HP**



Vivre avec une néphrostomie

La présence d'une néphrostomie nécessite quelques précautions simples:

- Maintenir le pansement propre et sec.
- Éviter les tractions sur le cathéter.
- Vider régulièrement la poche de drainage.
- La douche est généralement autorisée avec protection adaptée du pansement.
- Contacter rapidement l'équipe médicale en cas de fièvre, douleurs importantes, arrêt de l'écoulement des urines, fuite autour du cathéter ou arrachement accidentel.

Consentement

Consentement à l'intervention

Madame / Monsieur a été informé(e) des modalités de l'examen, des bénéfices à en attendre et des risques encourus et donne son accord pour la réalisation de l'acte.

Signature :

Fait le à

Consentement à l'exploitation des données

En acceptant votre prise en charge, vous consentez à l'utilisation confidentielle et anonymisée de vos données à des fins de recherche, d'enseignement ou d'amélioration des pratiques médicales, conformément à la réglementation en vigueur.

Signature :

Fait le à