

**FECI**

- **COPROCOLTURA:** le feci devono essere prelevate all'esordio dell'enteropatia, in fase diarreica e prima dell'inizio della terapia antibiotica. Le feci vanno raccolte in appositi contenitori con palettina forniti dal Punto prelievi o in vendita presso le farmacie. Per eseguire correttamente l'esame è necessaria una quantità di feci pari a una noce. È consigliabile raccogliere un campione del primo mattino, ma qualora questo non fosse possibile possono essere consegnate feci del giorno prima conservate in frigorifero a 2-8 °C. È opportuno segnalare al personale di Accettazione se sono in corso terapie antibiotiche, che potrebbero alterare i risultati.
- **ESAME DELLE FECI COMPLETO:** le feci vanno raccolte in appositi contenitori forniti dal Punto prelievi o in vendita presso le farmacie (non verranno accettati contenitori con liquidi conservanti). Per eseguire correttamente l'esame è necessaria una quantità di feci pari a una noce. Il materiale biologico può essere conservato a 2-8 °C per 24 ore.
- **RICERCA DEL SANGUE OCCULTO:** le feci vanno raccolte nel contenitore tappo verde chiaro fornito dal Punto prelievi (non verranno accettati contenitori diversi). È opportuno evitare di raccogliere il campione durante il ciclo mestruale. Si raccomanda di eseguire la raccolta di tre campioni di feci in giorni diversi. I campioni possono essere conservati in frigorifero a 2-8 °C e consegnati insieme.
- **CALPROTECTINA ED ELASTASI FCALE:** le feci vanno raccolte nel contenitore tappo blu fornito dal Punto prelievi (non verranno accettati contenitori diversi). Queste provette devono essere conservate a 2-8 °C sia prima sia dopo la raccolta.
- **RICERCA PARASSITI E LORO UOVA NELLE FECI:** le feci vanno raccolte in appositi contenitori con tappo giallo-bianco forniti dal Punto prelievi. Poiché l'eliminazione dei parassiti è saltuaria, per un corretto risultato è opportuno eseguire la raccolta di tre campioni di feci in giorni diversi. I campioni possono essere conservati in frigorifero a 2-8 °C e consegnati insieme.
- **SCOTCH-TEST:** materiali utili per l'esecuzione dello scotch-test (vetrino portaoggetti e porta vetrino), devono essere ritirati presso il Punto prelievi.
  1. Di sera, prima di andare a dormire, far aderire con decisione un tratto di scotch trasparente (non opaco) sulla cute della regione perianale.
  2. La mattina staccare lo scotch dalla cute perianale e distenderlo sul vetrino con la parte adesiva in basso.
  3. Consegnare il vetrino allocato nel porta vetrino al Punto Prelievi. Qualora il campione non possa essere consegnato rapidamente al Punto Prelievi deve essere conservato a 2-8 °C. Poiché la deposizione delle uova sulla cute perianale è intermittente possono essere necessari più campioni.