



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ้า



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

© Thirasak Chuchoet



ใช้งานผิดประเภท

ถูกต้อง-เหมาะสม

การจัดการโรค แมลงและโรคศัตรูพืชทุเรียน และ การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ร้านเสือการเกษตร จ.ชุมพร และนครศรีธรรมราช

ธีระศักดิ์ ชูชิด (เจมส์) มือถือ. 082-353-5156

8 พฤษภาคม 2568





© Thirasak Chuchot



มาร์ดูใบ





ขั้นตอนการติดตั้งแอป 🔍





มาร์ดูไบ




ยาเลกตราเจ็ด



© Thirasak Chuchoet



ขั้นตอนการติดตั้งแอป 🔍



- 4** เลือก 3 จุด มุมขวาบนสุด
เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ให้เลือก
จุด 3 จุด ด้านบนขวา หรือ
อาจเป็น 3 จิต (: หรือ ≡)



- 5** ค้นหา “เพิ่มลงในหน้าจอหลัก”
หรือภาษาอังกฤษ
“Add to Home screen”
กดเลือกและรอระบบติดตั้ง

- 6** ตั้งชื่อใหม่ เช่น “มาร์ดูไบ” แล้วกดติดตั้ง



ระบบจะติดตั้งอัตโนมัติ
ประมาณ 1-3 นาที





© Thirasak Chuchot



การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ใช้งานผิดประเภท

ถูกต้อง-เหมาะสม





การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

- ความปลอดภัย
- อุปกรณ์
- ลำดับผสมยา
- เทคนิคและสภาพแวดล้อม
- ชีววิทยาและนิเวศวิทยา
- ปฏิทินการระบาด
- ผู้ใช้งานและผู้ปฏิบัติ



ใช้งานผิดประเภท



ถูกต้อง-เหมาะสม



มาร์คูไบ

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

สารกำจัดแมลง

กลุ่ม / 9B / สารกำจัดแมลง

แป็คโตรซีน

ชื่อสามัญ :

ไพมีโตรซีน (pymetrozine)

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 419-2567 (ทะเบียนหมดยุ : 19 ก.พ. 2573)

กลุ่มสารเคมี : Pyridine Azomethine [กลุ่ม 9B]

สารสำคัญ : (E)-4,5-dihydro-6-methyl-4-(3-pyridylmethyleneamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-one 50% WG



เพลี้ยไฟ
ในข้าวโพดหวาน

1. ประเภทวัตถุอันตรายทางการเกษตร
2. กลุ่มสารกำจัดศัตรูพืช
3. ชื่อการค้าผลิตภัณฑ์
4. ชื่อสามัญ (สารออกฤทธิ์)
5. เลขทะเบียนวัตถุอันตราย
6. กลุ่มสารเคมี + กลุ่มกลไกออกฤทธิ์
7. สารสำคัญ + เฟอร์มิเลชันสาร + สูตรผสมปรุงแต่ง
8. สัญลักษณ์ข้อควรระวัง + แถบสีฉลาก

© Thirasak Chuchot



การผสม

ระวัง

การใช้



ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในข้าวโพดหวาน

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 7.5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟในข้าวโพดหวาน

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บ **แพ็คโทรซิน** ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นมีฉลากติดอยู่ และไม่ให้อุณหภูมิแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน : **แพ็คโทรซิน** เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ **ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามนี้**

1. **ห้าม** ดื่มน้ำ กินอาหารหรือสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน **ห้าม** เทสารที่เหลือหรือล้าง ภาชนะบรรจุอุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงใน แม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว **ห้าม** ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก **ห้าม** เด็ก และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร
2. ขณะผสม **ต้อง** สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นสาร **ต้อง** อยู่เหนือลมเสมอ และควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก **ต้อง** ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่หลังจากทำงานเสร็จแล้ว **ต้อง** อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้ กลั้วล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวมเอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุโดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย
3. **ระวัง** อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
4. **การใช้สารกำจัดแมลง** ซึ่งอยู่ในหมายเลขกลุ่มเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความ **ต้านทานของแมลง**
5. **เป็นพิษต่อสัตว์น้ำอื่นๆ ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ**

อาการเกิดพิษ : ยังไม่มีรายงานอาการเป็นพิษที่เกิดกับคน

9. ประโยชน์ (การใช้งานกับศัตรูพืช)

10. วิธีการใช้ (อัตรา)

11. วิธีเก็บรักษา

12. คำเตือน

13. อาการเกิดพิษ (เกี่ยวกับคน)



ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช



การแก้พิษเบื้องต้น :

1. ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากอาการไม่ทุเลา **รีบไปพบแพทย์**
2. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก นาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา **รีบไปพบแพทย์**
3. ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
4. ถ้าเข้าปากให้รีบ้วนน้ำล้างปาก หากกลืนกิน **ห้าม ทำให้อาเจียน** และ **ห้าม** ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น **รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก**

คำแนะนำสำหรับแพทย์ :

1. รักษาตามอาการ
2. หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ผู้ป่วยกิน activated charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg น้ำหนักตัว)

นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายโดย : บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด

2922/268 อาคารชาลวอริสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 22 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2308-2102 โทรสาร. 0-2308-2487

สถานที่ผลิต : 302 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5C ถนนพัฒนา 3 ตำบลแพรกษา

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2324-0515-6

วัน / เดือน / ปีที่ผลิต :

โปรดสแกนเพื่อดูวันที่หมดอายุ :



น้ำหนักสุทธิ 500 กรัม

14. การแก้พิษเบื้องต้น

15. คำแนะนำสำหรับแพทย์

16. ผู้นำเข้า, ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย
(ระบุ: ชื่อ, ที่อยู่และช่องทางติดต่อ)

17. สถานที่ผลิต

18. วัน-เดือน-ปี ที่ผลิต หรือหมดอายุ

19. ขนาดบรรจุ (กรัม หรือ มิลลิลิตร)



มาร์คูไบ

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

สัญลักษณ์บนแถบสีฉลาก “วัตถุอันตรายทางการเกษตร”



ยาเกษตร トラเจ็ค



ระดับความเป็นพิษของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช



ชั้น	ระดับความเป็นพิษ	LD ₅₀ สำหรับสัตว์ทดลอง (มก.ต่อน้ำหนัก 1 กก.)			
		ทางปาก		ทางผิวหนัง	
		ของแข็ง	ของเหลว	ของแข็ง	ของเหลว
I a	พิษร้ายแรงมาก	< 5	< 20	< 10	< 40
I b	พิษร้ายแรง	5-50	20-200	10-100	40-400
II	พิษปานกลาง	50-500	200-2,000	100-1,000	400-4,000
III	พิษน้อย	> 500	> 2,000	> 1,000	> 4,000



ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

สัญลักษณ์บนแถบสีฉลาก “วัตถุอันตรายทางการเกษตร”



ให้เก็บมิดชิดพ้นมือเด็ก



เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง



สวมอุปกรณ์ป้องกันตา



สวมหน้ากากป้องกันไอพิษ



สวมผ้าป้องกัน เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้



สวมรองเท้าป้องกันเท้า



พิษร้ายแรงมาก



พิษร้ายแรง



ระวัง



ให้ชำระล้างหลังการใช้



เป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำ ห้ามเททิ้งในแหล่งน้ำ



สวมอุปกรณ์ป้องกัน จมูกและปาก



สวมถุงมือป้องกัน การสัมผัสถูกมือ




สวมชุดป้องกันวัตถุอันตราย ตลอดตัวผู้ใช้ ขณะฉีดและใช้



อันตราย

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

หนทางเข้าสู่ร่างกาย





มาร์คูไบ



ยาเชตร トラเจท



ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช



© Thirasak Chuchoet



ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช



© Thirasak Chuchoet



ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช



ค่า ADI (Acceptable Daily Intake)

คือ ปริมาณสารต่างๆ ที่ร่างกายรับทุกวัน เป็นระยะเวลานาน และไม่พบความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ (หน่วย: mg./kg.bw./day หรือ มก./กก.นน.ตัว/วัน)

เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดค่า ADI ของ Dimethoate ดังนี้

WHO, 1983-85

0.03 มก./กก.นน.ตัว/วัน

WHO, 1996-2001

0.003-0.008 มก./กก.นน.ตัว/วัน

WHO, 2003

0.002 มก./กก.นน.ตัว/วัน

WHO, 2019

0.001 มก./กก.นน.ตัว/วัน



มาร์คใบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ค่า MRLs (Maximum Residue Limits)

คือ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในอาหารที่ยอมรับได้

(หน่วย: mg./kg. หรือ มก./กก.)

ค่า MRLs มีใช้ค่าที่บ่งชี้ถึงระดับความปลอดภัย แต่เป็นค่าที่ใช้ในทางการค้า

การกำหนดค่า MRLs อยู่บนพื้นฐานการประเมินข้อมูลที่เหมาะสมครบถ้วน และ
อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยจะมีคณะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษตกค้าง
เป็นผู้ประเมินข้อมูลทั้งทางด้านสารพิษตกค้างในอาหาร ผลผลิตเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านสมบัติและพิษวิทยาของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ผลตรวจสารพิษตกค้างในผลส้ม

ส้มไม่ลอกเปลือก

คาร์เบนดาซิม <0.005-0.09 มก./กก.

โดเมโทเอต 0.30 มก./กก.

โอมโทเอต <0.05 มก./กก.

ไพรฟิโนฟอส 0.28-0.78 มก./กก.

คาร์บาไรล 0.73 มก./กก.

คาร์โบฟูราน 0.03 มก./กก.

ไซเพอร์เมทริน 0.35 มก./กก.

ส้มลอกเปลือก

คาร์เบนดาซิม 0.08-0.09 มก./กก.

โดเมโทเอต <0.05 มก./กก.

โอมโทเอต <0.05 มก./กก.

คาร์บาไรล <0.01 มก./กก.

designed by freepik



ผลตรวจสารพิษตกค้างในผลส้ม

Dimethoate ตกค้างในเนื้อส้ม <0.05 ppm หมายความว่า
ผลส้มปอกเปลือก 1 กก. มี Dimethoate น้อยกว่า 0.05 มก.

โดยค่า MRLs ของ Dimethoate เท่ากับ (CXL) 5.0 มก./กก.
และ ค่า ADI เท่ากับ 0.001 มก./กก.นน.ตัว

(จะเห็นได้ว่าค่า MRLs ปลอดภัยกว่าค่า ADI ถึง 5,000 เท่า)

ส้มไม่ปอกเปลือก

ส้มปอกเปลือก

คาร์เบนดาซิม <0.005-0.09 มก./กก.

คาร์เบนดาซิม 0.08-0.09 มก./กก.

ไดเมโทเอต 0.30 มก./กก.

ไดเมโทเอต <0.05 มก./กก.

ไอมิโทเอต <0.05 มก./กก.

ไอมิโทเอต <0.05 มก./กก.

โพรฟิโนฟอส 0.28-0.78 มก./กก.

คาร์บาริล 0.73 มก./กก.

คาร์บาริล <0.01 มก./กก.

คาร์โบฟูราธ 0.03 มก./กก.

ไซเพอร์เมทริน 0.35 มก./กก.

ตัวอย่าง : เนื้อส้มที่มี Dimethoate ตกค้าง คนที่น้ำหนักตัว 50 กก.สามารถรับประทานส้มได้ที่ กก.?

$$\frac{(ADI \ 0.001) \times (\text{น้ำหนักตัว } 50 \text{ กก.})}{(\text{พิษตกค้าง } <0.05 \text{ มก.})} = \text{ทานได้มากกว่า 1 กก. ต่อวัน}$$



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

© Thirasak Chuchoet



อุปกรณ์พ่นสารกำจัดศัตรูพืช




มาร์คูไบ




ยาเกษตร トラเจ็ค

หัวฉีดแบบรูปกรวย
(cone type nozzle)




หัวฉีดแบบแรงปะทะ
(impact type nozzle)



หัวฉีดแบบรูปพัด
(fan type nozzle)



Type FA nozzle



แบบมาตรฐาน



แบบให้การกระจายสม่ำเสมอ



อุปกรณ์พ่นสารกำจัดศัตรูพืช




เครื่องพ่นสารแบบใช้แรงคน (มือ)



เครื่องพ่นสารแบบใช้แรงคน เครื่องแบตเตอรี่

การพ่นยาแบบ น้ำมาก



เครื่องพ่นสารแบบใช้แรงคน เครื่องยนต์

อุปกรณ์พ่นสารกำจัดศัตรูพืช



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



Tiger Agriculture Since 2000

การพ่นยาแบบ น้ำน้อย



เครื่องพ่นสารแบบแอร์บลิส

เครื่องพ่นสารแบบโดรน

© Thirasak Chuchot





อุปกรณ์พ่นสารกำจัดศัตรูพืช

การพ่นด้วยโดรน : อาการใบไหม้ จากการผสมสารหลายชนิด



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ้า



© Thirasak Chuchoet



ลำดับการผสมสารกำจัดศัตรูพืช



ลำดับผสมยา

© Thirasak Chuchoet



© Thirasak Chuchoet



ลำดับการผสมสารกำจัดศัตรูพืช



มาร์คูใบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000



© Thirasak Chuchot





ผังลำดับผสมสาร: เรียงจากลักษณะการละลายเมื่อผสมน้ำ



สวมแว่นและ
หน้ากาก



สวมถุงมือยาง
หรือ PPE



ควรละลายสาร
ในถังเล็กก่อนเสมอ

1 สารปรับสภาพน้ำ

สารคงสภาพ/ปรับ pH น้ำ

2 สารละลายคีเลต

สารคีเลต, สาหร่าย, อะมิโน, น้ำตาลทางด่วน

3 สารแขวนลอย

สูตรผสม WP, WG, DS, SP, SG, SC, CS, ZC

4 สารละลาย

สูตรผสม SL

5 สารละลายมีประจุ

จุลธาตุ, ธาตุรอง, ธาตุหลัก

6 สารจับใบ

สารจับใบ, สารเร่งซึ่ม, สารแพร่กระจาย

7 สารละลายน้ำมัน

สูตรผสม ZW, ZE, OD, SE, EW, ME, EC

8 น้ำมัน

ไวท์ออยล์, พาราฟินออยล์, ปีโตรเลียมออยล์

ลำดับการผสมสารกำจัดศัตรูพืช



ลำดับการผสมสารกำจัดศัตรูพืช



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000



สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (Pesticides)

ยาผง

ยาเม็ด

ยาน้ำครีม

ยาน้ำใส

ยาน้ำมัน

“ภาพถ่ายอย่างประกอบบทความเท่านั้น”

© Thirasak Chuchoet





สูตรผสมสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticides formulate)

สูตร	ชื่อเต็ม	ลักษณะเนื้อสาร	การใช้/ผสมน้ำ
GR	Granules	ยาเคลือบเมล็ดทราย	หว่าน/รองก้นหลุม
WP	Wettable Powders	ผง	แฉ้วนลอย
WG	Water dispersible granules	เม็ด /เม็ดแท่ง	แฉ้วนลอย
WS	Water dispersible powders for slurry seed treatment	เนื้อผง (คลุกเมล็ด)	แฉ้วนลอย
DS	Powder for dry seed treatment	ผงละเอียด (คลุกเมล็ด)	แฉ้วนลอย
SG	Water Soluble Granule	เม็ด /เม็ดแท่ง	สารละลาย+แฉ้วนลอย
SP	Water soluble powders	ผงละเอียด	สารละลาย+แฉ้วนลอย



สูตรผสมสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticides formulate)



สูตร	ชื่อเต็ม	ลักษณะเนื้อสาร	การใช้/ผสมน้ำ
SC	Suspension concentrates	เนื้อครีมข้น/จาง	สารละลาย+แวนดอย
FS	Flowable concentrates for seed treatment	เนื้อครีม	สารละลาย+แวนดอย
CS	Capsule suspension	เนื้อครีม	สารละลาย+แวนดอย
ZC	Mixed formulation of CS and SC	เนื้อครีม	สารละลาย+แวนดอย





มาร์คูไบ

สูตรผสมสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticides formulate)

สูตร	ชื่อเต็ม	ลักษณะเนื้อสาร	การใช้/ผสมน้ำ
SL	Soluble concentrates	ของเหลวสีใส	สารละลาย
OD	Oil-based suspension concentrates	ของเหลวหนืดในน้ำมัน	สารคงสภาพด้วยน้ำมัน ผสมน้ำเป็นสารแขวนลอยและสารผสมปรุงแต่งเป็นอิมัลชัน
SE	Aqueous suspo-emulsion	ของเหลวหนืดในน้ำมัน	
ZW	Mixed formulation of CS and EW	ของเหลวในน้ำมัน	
ZE	Mixed formulation of CS and SE	ของเหลวหนืดในน้ำมัน	



สูตรผสมสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticides formulate)

สูตร	ชื่อเต็ม	ลักษณะเนื้อสาร	การใช้/ผสมน้ำ
EW	Emulsion, oil in water	ของเหลวในน้ำมันสีขาว	สารละลายในน้ำมัน (อิมัลชัน)
EM	Micro-emulsion	ของเหลวในน้ำมันสีใส	
EC	Emulsion concentrates	ของเหลวในน้ำมันสีใส	
ES	Emulsion for seed treatment	ของเหลวในน้ำมัน	



ข้อควรระวังการผสมปุ๋ยทางใบ

กรณี มีการผสมแคลเซียมไนเตรท (15-0-0) แมกนีเซียมไนเตรท (10-0-0) แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) หรือแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl_2) ร่วมกับปุ๋ยฟอสฟอรัสเปอร์เซ็นต์สูง เช่น 13-13-13, 16-16-16, 20-20-20, 0-52-34, 9-19-34, 10-52-17 ควรแยกทดสอบอัตราการใช้ที่จะผสมในปริมาณน้ำน้อยๆ ก่อน เช่น ผสมในแก้วน้ำหรือเหยือกน้ำ โดยลดทอนสัดส่วนผสมตามปริมาณน้ำ เนื่องจาก อาจเกิดการตกตะกอน หรือตกผลึกของปุ๋ย และพืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

ปุ๋ยธาตุหลัก (N-P-K) และธาตุรอง (Ca, Mg, S) หากผสมอัตราผสมปุ๋ยธาตุหลัก-ธาตุรอง เท่ากับ 175 กรัม หรือ ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตรขึ้นไป ควรมีการทดสอบอัตราผสมรวมกับสารกำจัดศัตรูพืชและทดสอบพ่นพืชก่อน เนื่องจากอาจเกิดความเป็นพิษต่อพืชได้



มาร์คูไบ

มีคำถามมาว่า.. ทำยังไงจะผสมปุ๋ย 15-0-0 ร่วมกับ 0-52-34 แล้วไม่ตกตะกอน?

น้ำกรด pH 3-3.5

น้ำ PH 6-6.5

น้ำกลั่น pH 7

น้ำ PH 7.5-8.5

ภาพโดย: คุณ Sumeth Phudarat



มาร์คทูไบ



ยาเกษตร ตราเจ้า

©Thirasak Chuchoet



(เอกสารฉบับปรับปรุง: พฤษภาคม 2563)

☐ ผสมกันได้

■ **ผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวัง**

❑ ไม่มีความจำเป็นต้องพสมกัน

อย่าพสมกันจนกว่าจะได้คำรับรองจากผู้ผลิต

1 คุร่ายละเอียดยด้านล่าง

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

สารกำจัดแมลง

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

อามิตรราช

เบตาไฮฟลูริน, ไฮฟลูริน

		๘
		ไฮฟุนทริน

คาร์บาริล

คลอร์ฟลาซรอน, โดฟลามบรอน, ฟลาฟนบอซรอน, โดฟลามบรอน

					ไฮเพอร์เมทรีน, เพอร์เมทรีน
--	--	--	--	--	----------------------------

						โอบอ้อมอารี, ทนอดทน
						โดะชินอน, เมกิดาโทออน

โดโคฟอล, คลอร์โรเบนซิลีน

โดมโทเอต, โดคลอร์วอส

[illegible]

เพ็ญโรโร

[illegible]

แลมปีดาโซฮาโลกรีน

[illegible][illegible][illegible]

ปีเตอร์เลียม ออยล์

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

คอปเปอร์ออกไซด์

[illegible][illegible]

1 11 16 แบบโตชุน. ไทรอน

[illegible]

เบอร์โดมิกซ์เจอร์ส

[illegible]

คำจำกัดความ

ที่มา: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร (2563), คู่มือผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร (2566)



รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเลขที่กำกับบนผังผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

1. อามีทราซ ผสมกับ มาเนบ, ซิเนบ และแมนโคเซบ ได้ แต่ผสมกับ ไทแรม ไม่ได้

2. คาร์บาริล ผสมกับ ไดเมโทเอต อาจเป็นพิษต่อตัวเหลือง และมะเขือเทศได้, คาร์บาริล ผสมกับ ไดเมโทเอต หรือ มาลาไทออน อาจเป็นพิษต่อฝ้าย

3. คาร์บาริล ผสมกับ ปีโตรเลียม ออยล์ อาจเป็นพิษต่อแอปเปิ้ล

4. คาร์บาริล ผสมกับ แคปทาฟอล ทำให้ผลอ่อนมะเขือเทศเป็นจุดในช่วงฤดูร้อนหรือในช่วงมะเขือเทศขาดน้ำ

5. หลังพ่น กำมะถัน (ซิลเวอร์ ผง) 2 สัปดาห์ จึงพ่น ไดโคฟอล ได้

6. ไดโคฟอล ผสม แคปแทน (ผง) ได้

7. อย่าผสม ไดเมโทเอต กับ ปีโตรเลียมออยล์ พ่นไม้ประดับ

8. มาลาไทออน ผสมกับ แคปแทน ในรูปผงเท่านั้น

9. หากผสม มาลาไทออน กับ ไอโพรโดโอน ควรใช้เครื่องพ่นที่มีระบบกวนในถัง และรีบพ่นทันที

10. อย่าผสม เบโนมิล กับ แคปแทน พ่นส้ม

11. เบโนมิล ผสมกับ มาเนบ และแมนโคเซบ ได้ แต่ไม่จำเป็นต้องผสม ไทแรม

12. ผสมสารจับใบตามอัตราที่ระบุบนฉลาก

13. ไทโอติคาร์บ ผสมกับ คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ ได้ แต่ต้องใช้ภายใน 6 ชั่วโมง

14. เฟนิโตรไทออน ผสม บอร์โดมิกซ์เจอร์ ได้ แต่ต้องรีบใช้ทันที



มาร์คูไบ



ยาเชตร ตราเจ็ด



รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเลขที่กำหนดบนฉลากผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ต่อ)

15. อย่าผสม ไอโพรไดโอน (สูตรน้ำ) กับ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ฟันมันฝรั่ง

16. อย่าผสมสารที่มีส่วนประกอบของทองแดง หรือคอปเปอร์ชนิดต่างๆ กับ ไทแรม

17. ฮอร์โมนพืช ที่เป็นสารประกอบ แนฟทาลีน อะซิติก, แนฟทาลีน อะซิทามีน และ ฟีน็อกซี ส่วนใหญ่ เช่น NAA สามารถผสมกับสารกำจัดแมลงและสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้ ยกเว้นสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างจัด หากจำเป็นต้องพ่น ควรพ่นฮอร์โมนเหล่านี้แยก หรือใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

18. สารปฏิชีวนะ (สเตรปโตมัยซิน, แอกรี-สเตรป, แอกรีมัยซิน) พ่นเดี่ยวๆ มีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่สามารถผสมกับ ไดเมโทเอต, แคปแทน และกำมะถัน (ซัลเฟอร์ ผง) ได้ แต่ห้ามผสมกับ บอร์โดมิกเจอร์ หรือสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

19. ไวรัส NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus) ผสมกับสารกำจัดแมลงได้ทุกชนิด

20. เชื้อแบคทีเรีย บีที (Bacillus thuringiensis) โดยส่วนใหญ่ผสมกับสารกำจัดแมลงและสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้ และเมื่อผสมแล้วควรพ่นทันที แต่ห้ามผสมกับสารเหล่านี้ คือ อามิทรากซ์, อะซินฟอสเมทิล, แคปทาฟอล, ไดเมโทเอต, ไดโนแคป, ไอโซโปรคาร์บ, เฟนโทเอต, โฟซาโลน และบอร์โดมิกซ์เจอร์

21. สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชข้างบนนี้ เป็นชื่อสามัญทั้งหมด

22. ฉลากข้างบนนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำให้ใช้ แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การผสมสารบางอย่างอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และพืชได้

ข้อควรระวัง


1. การผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆ อาจแตกต่างจากฉลากผสมนี้ เนื่องจากสูตรผสมของสารเหล่านั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

2. อย่าผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในน้ำที่มีสภาพเป็นด่างจัด หรือสารอื่นๆ รวมถึงปุ๋ยที่เมื่อผสมน้ำแล้วมีสภาพเป็นด่าง



ยาอะไรดีที่สุด.?

ตั้งคำถามผิด.. ชีวิตเปลี่ยน.!!



“ภาพตัวอย่างเพื่อประกอบบทความ เท่านั้น”



ยากกลุ่มใหม่ นะ ดี แน่ !!!



✓ ใหม่จริง

หรือ ▶



✓ ใหม่.. ฟังมีขาย

VS



✗ ใหม่ของผม.. เก่าของเขา..!

หรือ ▶





มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

© Thirasak Chuchoet



เลือกยาเปอร์เซ็นต์สูง หรือ ต่ำ ..?

กรณี: ชื่อสารสามัญตัวเดียวกัน.. แต่เปอร์เซ็นต์ต่างกัน



ยาน้ำใส

หรือ ▶



ยาน้ำครีม

หรือ ▶



ยาน้ำครีมคลุกเมล็ด

หรือ ▶



ยาเม็ด



ข้อควรพิจารณา..?

- ✓ เลือกที่ราคา โดยเทียบเปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์
- ✓ การละลาย และความสะดวกใช้งาน
- ✓ เปอร์เซ็นต์สูง อัตราใช้น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำ

แพ็คมิดา 70 (อิมิดาโคลพรีด 70%WG)

- ชอง 100 กรัม มีสารออกฤทธิ์ (a.i.) = 70 กรัม
- ถ้าใช้อัตรา 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร จะมีสารออกฤทธิ์เท่าไร ..?

$$\frac{(200 \text{ กรัม}) \times (70 \text{ กรัม})}{(100 \text{ กรัม})} = \text{สารออกฤทธิ์ } 140 \text{ กรัม}$$



แพ็คมิดา35 (อิมิดาโคลพรีด 35%SC)

- ขนาด 100 ซีซี. มีสารออกฤทธิ์ (a.i.) = กรัม
- ถ้าต้องการสารออกฤทธิ์ 140 กรัม ผสมในน้ำ 200 ลิตร

ต้องใช้แพ็คมิดา35 อัตราเท่าไร ..?

$$\frac{(140 \text{ กรัม}) \times (100 \text{ กรัม})}{(35 \text{ กรัม})} = 400 \text{ ซีซี. ต่อ } 200 \text{ ลิตร}$$



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000



แพ็คมิดา70 กิโลกรัมละ 1,000 บาท

- อัตราใช้ 200 กรัม/น้ำ 200 ลิตร
(200 x 1,000 บาท)/1,000 กรัม
= 200 บาท/ถัง 200 ลิตร

ตัวไหนถูก..?

แพ็คมิดา35 ลิตร 500 บาท

- อัตราใช้ 400 ซีซี./น้ำ 200 ลิตร
(400 x 500 บาท)/1,000 ซีซี.
= 200 บาท/ถัง 200 ลิตร



เลือกยาเปอร์เซ็นต์สูง หรือ ต่ำ ..?

กรณี: ชื่อสารสามัญต่างกัน-เปอร์เซ็นต์ต่างกัน..



VS



VS



เปอร์เซ็นต์ต่างกันหรือเหมือนกัน แต่คนละชื่อสามัญบอกไม่ได้ว่าสารใดดีกว่ากัน



ใช้ยา 2 ตัวบวกในขวดเดียว ดีกว่ายาเดี่ยว (จริงรึอ..?) และ ใช้ยา 2 ตัวบวก ลดอัตราลงได้ไหม..?



กลุ่ม 1A+2B สารกำจัดแมลง

ลิงจรี

ชื่อสามัญ: ฟิโนบูคาร์บ + ฟิโพรนิล
16%+2% W/V EC

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่: 999-2999

กลุ่มสารเคมี: xxx
สารสำคัญ: xx
..... 16%+2% W/V EC

ฟิโนบูคาร์บ ตัวเดียวมีเปอร์เซ็นต์ = 50%
เมื่ออัตราใช้ 300 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร เท่ากับมีสาร
ออกฤทธิ์ 150 กรัม ในน้ำ 200 ลิตร

ถ้าจะใช้ **ลิงจรี** ให้ได้ปริมาณสารออกฤทธิ์ของ
ฟิโนบูคาร์บ 150 กรัม จะต้องใช้

ลิงจรี อัตรา 937.5 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

ใช้ 2 ตัวบวกในถังเดียว ลดอัตรายาได้ไหม..
ตอบ: “ไม่ได้” เพราะปริมาณสารออกฤทธิ์ไม่
เพียงพอต่อจุดที่สารเข้าไปออกฤทธิ์



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
เกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

ใช้ยา 2 ตัวบวกในขวดเดียว ดีกว่ายาเดี่ยว (จริงรึอ..?)

และ ใช้ยา 2 ตัวบวก ลดอัตราลงได้ไหม..?

ฟิโพรนิล ตัวเดียวมีเปอร์เซ็นต์ = 5%

เมื่ออัตราใช้ 300 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร เท่ากับมีสารออกฤทธิ์ 15 กรัม ในน้ำ 200 ลิตร

ถ้าจะใช้ **ลิงจรีา** ให้ได้ปริมาณสารออกฤทธิ์ของฟิโพรนิล 15 กรัม จะต้องใช้

ลิงจรีา อัตรา 750 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

ใช้ 2 ตัวบวกในถังเดียว ลดอัตรายาได้ไหม..
ตอบ: “ไม่ได้” เพราะปริมาณสารออกฤทธิ์ไม่เพียงพอต่อจุดที่สารเข้าไปออกฤทธิ์

กลุ่ม 1A+2B สารกำจัดแมลง



ลิงจรีา

ฟิโนบูคาร์บ + ฟิโพรนิล
16%+2% W/V EC

อัตราเลขที่: 999-2999

: xxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16%+2% W/V EC

ใช้ยาตัวเดียวต่อถังอัตราสูงอันตราย.. แล้ว 2 ตัวบวกในถังละ..?



400 ซีซี.
ต่อน้ำ 200 ลิตร

VS



200 ซีซี.
ต่อน้ำ 200 ลิตร



200 ซีซี.
ต่อน้ำ 200 ลิตร



มาร์ดูไบ



ยาเลกตร้าเจ็ท



ยาร้อน-ยาเย็น: ยาร้อนคือยาน้ำมัน หรือยา EC..?



ยากันยุงสูตรน้ำ

ไพโรฟิโอฟอส 50% EC อัตรา 800 ซีซี./น้ำ 200 ลิตร



มาร์คูไบ



ยาเป็นพิษ : พิรีมฟอส-เมทิล บวก ปีโตรเลียมออกซัล



ยาเป็นพิษ : พรีมิลฟอส-เมทิล บวก ปิโตรเลียมออยล์

อะบาเมกติน น้ำใสฆ่าหอย-น้ำข้นฆ่าเพลี้ย



อะบาเมกติน 1.8% EC (น้ำใส)

อะบาเมกติน 1.8% EC (น้ำข้น)


สารจับใบชนิดแรงซึม ถ้าใช้มากเกินไปหรือฉีดอัตรา



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



© Thirasak Chuchoet





ยากุมไข่ - ยาฆ่าไข่



VS



ยากุมไข่ คือ สารกำจัดแมลง-ไรศัตรูพืช ที่มีกลไกออกฤทธิ์ที่ยาวไกล ต่อการยับยั้งการสร้างผนังลำตัว ผนังไข่ และมีผลต่อการพัฒนารังไข่ของเพศเมีย รวมถึงการผลิตสเปิร์ม

ยาฆ่าไข่ คือ ยาที่พ่นไปสัมผัสไข่ ภายหลังเพศเมียวางไข่บนพืช และทำให้ไข่ฟ่อ

พ่นยาตอนไหน.. เหมาะที่สุด.?





มาร์คูใบ



ยาเชตร ตราเจ็ด



Tiger Agriculture Since 2000

ปฏิทินการเข้าทำลายของศัตรูพืช



แตกใบอ่อน - ใบแก่

1. เพลี้ยไฟ
2. เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน
3. เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
4. ตระกูลหนอนม้วนใบและหนอนบู่/หนอนร่าน
5. แมลงค่อมทองและด้วง (แมงมูน ด้วงกุหลาบ)
6. ไส้แดง

ระยะไข่ปลา - ติดผลอ่อน

1. เพลี้ยไฟ
2. หนอนเจาะดอก/หนอนเจาะผล
3. เพลี้ยแป้ง + มด
4. ไส้แดง
5. โรคดอกเน่า

ผลอายุ 45 วัน - เก็บเกี่ยว

1. หนอนเจาะเมล็ด
2. หนอนเจาะผล
3. เพลี้ยแป้ง
4. ไส้แดง

โรคใบจุดโพมอฟซิส, โรคใบติด, โรคแอนแทรคโนส, โรคราดำ, ใบจุดสาหร่าย, โรคราสีชมพู, โรคราหน้าโคนเน่า-โรคใบไหม้ดำ, โรคกิ่งแห้งตาย (ไฟทอปธอรา + พิวซาเรียม), โรคผลเน่า, มอดเจาะลำต้น, เพลี้ยหอย, ด้วงหนวดยาว, ไส้เดือนฝอย

ปฏิทินการเข้าทำลายของศัตรูพืช

ระยะเวลาเจริญเติบโตของใบทุเรียน: ~ 45-60 วัน




แตกใบอ่อน (Initial stage) → 3 วัน → ใบหางปลา (Longtail leaf stage) → 7 วัน → ใบคลี่กาง (Leaf spacing stage) → 20-25 วัน → ใบเพสลาด (Mature stage) → 7-14 วัน → ใบแก่ที่สมบูรณ์ (Mature stage)





ปฏิทินการเข้าทำลายของศัตรูพืช

การเจริญเติบโตของดอกทุเรียน: ~ 45-60 วัน





มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ้า



© Thirasak Chuchoet



ปฏิบัติการเข้าทำลายของศัตรูพืช



ปฏิทินการเข้าทำลายของศัตรูพืช

ระยะเก็บเกี่ยว: ฤดูร้อน ~90-100 วัน ฤดูฝน ~100-110 วัน ฤดูหนาว ~110-120 วัน ฤดูร้อน ~115 วัน พืชพันธุ์ ~110 วัน หลิน/หล่ง ~110 วัน



ดอกบาน

4-7 วัน



หางแย้ไหม้

7 วัน




ไข่นกกระทา

7-10 วัน



ไข่นก



เพลี้ยไฟ



เพลี้ยแป้ง

ระยะวิกฤตของพืช



เก็บเกี่ยว

ปฏิบัติการเข้าทำลายของศัตรูพืช





มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของศัตรูพืช

หนวด มี 7-8 ปล้อง

ปากมีกรามซ้ายข้างเดียว

ตา 2 คู่

ตาเดี่ยว

ขา 3 คู่

ปีก 2 คู่

ขน รอบปีก

ปล้องส่วนท้อง 10 ปล้อง



ชีววิทยาและนิเวศวิทยา ศัตรูพืช

© Thirasak Chuchot




© Thirasak Chuchot



ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของศัตรูพืช

เรียกติดกันจนเกษตรกรเข้าใจว่า เป็นแมลงชนิดเดียวกัน



ศัตรูพืช 2 ตัวนี้แตกต่างกันตรงไหน..?

ศัตรูพืช 2 ตัวนี้แตกต่างกันตรงไหน..?

แมลง มีส่วนของลำตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หัว อก ท้อง และมี ... ขา ?

ไร มีส่วนของลำตัวแบ่งเป็น ... ส่วน ? คือและมี ... ขา ?





มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของศัตรูพืช

มีส่วนของลำตัวแบ่งเป็น ... ส่วน คือ และมี ... ขา ?



เพลี้ยไฟ



หนอนกระทู้



เพลี้ยแป้ง



ไรแดง

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของศัตรูพืช



มาร์คูไบ



ลายที่ผลส้มและมะนาว
เหมือนกับไหม..?



ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของศัตรูพืช



ไรแดงแอฟริกัน.. ไม่ได้หมายความว่าตัวต้องแดง

ไรศัตรูพืช อาจอยู่ร่วมกันได้มากกว่า 1 ชนิด ในพืชเดียวกัน



มาร์ดูบู



ยาเลกตราเจ็ก



Tiger Agriculture Since 2000



แมลง โร เชื้อโรค และวัชพืชดื้อยา

➤ ปัจจุบันที่พูดถึงกันมากที่สุด

แบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์ (Mode of Action) คือ **ตำแหน่งหรือจุดจับ**ของสารกำจัดศัตรูพืช มีผลกระทบ / ยับยั้งกระบวนการชีวะสังเคราะห์หรือเมตาบอลิซึมของศัตรูพืช

1. **IRAC** : Insecticide Resistance Action Committee
2. **FRAC** : Fungicide Resistance Action Committee
3. **HRAC** : Herbicide Resistance Action Committee

กลไกออกฤทธิ์ต่อทางเดินอาหารส่วนกลาง (Midgut): เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในแมลง



© Thirasak Chuchoet




© Thirasak Chuchoet

Document protected by © Copyright.



การออกฤทธิ์ของสารกำจัดแมลงต่อระบบภายในของแมลง



ความต้านทานต่อสารกำจัดศัตรูพืช (ดื้อยา)



■ ความต้านทานข้าม Cross Resistance

“ความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงชนิดหนึ่งชนิดใด แล้วสามารถต้านทานต่อสารกำจัดแมลงชนิดอื่นที่อยู่ในกลุ่มสารเดียวกันหรือสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่จูดรับเดียวกัน”

เช่น แมลงต้านทานสาร DDT ที่อยู่กลุ่ม Organochlorines จะต้านทานสารที่อยู่ในกลุ่ม Pyrethroids ด้วย หรือ แมลงต้านทานสารในกลุ่ม Carbamates แมลงจะมีความสามารถต้านทาน สารในกลุ่ม Organophosphate ได้ดี

■ ความต้านทานข้ามแบบ Negative Cross Resistance

“ความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงชนิดหนึ่งชนิดใดและความต้านทานนี้มีผลให้เกิดความอ่อนแอต่อสารกำจัดแมลงอีกชนิดหนึ่ง”

■ ความต้านทานแบบ Multiple Resistance

“การที่แมลงมีกลไกความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงหลายอย่างในแมลงตัวเดียว”



มาร์คใบ

ความทนทาน (insecticide tolerance) และ ความต้านทานหรือดื้อยา (insecticide resistance)



ยาเกษตร ตราเจ็ท



การประเมินความทนทานและการดื้อยา ใช้ค่า LC_{50} หรือ LD_{50} ของแมลงที่
ต้องการทดสอบ หาดด้วยค่า LC_{50} หรือ LD_{50} ของแมลงที่อ่อนแอ ดังนี้

- ค่าที่ได้ 2-5 เท่า = ปกติ
- ค่าที่ได้ 5-7 เท่า = ทนทาน
- ค่าที่ได้ 7-9 เท่า = ทนทานมาก
- ค่าที่ได้เท่ากับหรือมากกว่า 10 เท่า = ต้านทาน (ดื้อยา)



ความทนทาน (insecticide tolerance) และ ความต้านทานหรือดื้อยา (insecticide resistance)



สาเหตุหลัก

1. เอนไซม์ย่อยสลายสารพิษ (detoxification enzymes)
2. การกลายพันธุ์ของยีน (mutation)



มีรายงาน การสร้างความต้านทาน (ดื้อยา) ข้ามกลุ่ม สารกำจัดแมลง ระหว่างกลุ่ม 4A กับ กลุ่ม 9




กลไกความต้านทานนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 (Cytochrome P450)
เป็นเอนไซม์ย่อยสลายสารพิษได้อย่างกว้างขวางของแมลง (detoxification enzymes)

รายงานครั้งแรกใน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล



มาร์คูไบ

ตัวอย่าง: โปรแกรมการพ่นป้องกันแมลงศัตรูพืช ที่เปิดโอกาสให้แมลงดีอยู่




แตกใบอ่อน | ใบคลี่กาง | ใบเฟสลาด | ใบแก่ | ใบแก่



~ 56 วัน



ตัวอย่าง: โปรแกรมการพ่นป้องกันแมลงศัตรูพืช เพื่อชะลอหรือลดการตัดยา




แตกใบอ่อน | ใบคลี่กาง | ใบเฟสลาด | ใบแก่ | ใบแก่



~ 56 วัน



ตัวอย่าง: โปรแกรมการพ่นป้องกันแมลงศัตรูพืช เพื่อชะลอหรือลดการตัดยา



แตกใบอ่อน | ใบคลี่กาง | ใบเฟสลาด | ใบแก่ | ใบแก่



~ 56 วัน



มาร์คูใบ

อย่าง: โปรแกรมการพ่น “ป้องกัน” แมลงศัตรูพืช เพื่อชะลอหรือลดการตัดยา



เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไก่ไข่

เพลี้ยจักจั่นฝอย



ไรแดง



4A



7C



แพ็คมิดา 35
200-350 ซีซี.



6



16

แพ็คมิดา 35
250-350 ซีซี.

แพ็คบูซิน
300-400 ซีซี.



2B

แพ็คบูซิน
250-400 ซีซี.



1B

แพ็คบูซิน
300-400 ซีซี.



4A



7C



แพ็คมิดา 35
200-350 ซีซี.

แพ็คบูซิน
200-300 ซีซี.

1 วัน | 8 วัน | 14 วัน

15 วัน | 22 วัน | 28 วัน

29 วัน | 39 วัน | 42 วัน

43 วัน | 46-50 วัน | 57 วัน



ขอขอบคุณ
ใหม่



ตัวอย่าง: โปรแกรมการพ่น “กำจัดเพลี้ยจักจั่นฝอย” เพื่อชะลอหรือลดการดื้อยา



แพ็คบิดา 35
200-350 ซีซี.

แพ็คเกจ 200-300 ซีซี.



แพคกิ่ง-อ
250-350 ซีซี.



แพ็คบูชีน
300-400 ซีซี.



แพคเกจ 250-400 ซีซี.



แพคเกจ 300-400 ซีซี.



เปิดตัว 35
200-350 ซีซี.



แพ็คเกจ 200-300 ซีซี.

1 วัน

8 วัน

10 ၁၅ 14 ၁၅

15 วัน

22 ວັນ

28 วัน

29 วัน

39 วัน

42 วัน

43 วัน

46-50 ခု

57 วัน

2 ครั้ง ต่อเนื่อง



IIWUW
300-400 ชั.



แป็คไทรชีน
150-200 ซีซี.



**ยอดสด
ใหม่**



เพลี้ยจักจั่นฝอย



สารกำจัดแมลงที่เหมาะสมร่วมกัน อาทิเช่น

กลุ่ม 1, 2, 3, 4, 5, 28 : กลุ่มกลไกออกฤทธิ์กระตุ้นกระแสประสาทมากเกินไป

กลุ่ม 6, 14, 22 : กลุ่มกลไกออกฤทธิ์ยับยั้งการส่งกระแสประสาท

กลุ่ม 12, 13, 20, 21 และ 25 : กลุ่มกลไกออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสร้าง

พลังงานหรือการหายใจระบบเซลล์

สารกำจัดแมลงที่ไม่ควรผสมร่วมกันหรือควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากกลไกออกฤทธิ์อาจจะต้านกัน
หรือหักล้างกัน เช่น

กลุ่ม 14 หักล้างกลไกการออกฤทธิ์ **กลุ่ม 4 และ 5**


กลุ่ม 7 หักล้างกลไกการออกฤทธิ์ **กลุ่ม 18**





มาร์คูไบ

โปรแกรมการป้องกันและกำจัดโรคพืช พร้อมทั้งชะลอหรือลดกาต้อยา



Chlorothalonil

ยากกลุ่ม M

Strobiurin

ยากกลุ่ม 11

Triazoles

ยากกลุ่ม 3

Premix

ยากกลุ่ม 11+3 + M

มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อรา

ไม่มีผลหรือมีผลต่อเชื้อราเล็กน้อย



* หลักการหนึ่งของการชะลอความต้านทานของโรคพืช

คุณสมบัติ	รอบการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช /ระยะพืช		
ดูดซึม (Systemic)	กลุ่ม 11+3 (Strobilurins+Triazoles)	กลุ่ม 3 (Strobilurins)	กลุ่ม 1 (Benzimidazoles)
การผสมสาร	ผสม (+)	ผสม (+)	ผสม (+)
สัมผัส (Contact)	M03 (Dithiocarbamates)	M03 (Dithiocarbamates)	M03 (Dithiocarbamates)




กลุ่ม 11; อะซอกซิสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ไตรฟ্লอกซิสโตรบิน เมโทมิโนสโตรบิน (ดูดซึมผ่านราก)

กลุ่ม 3; ไดฟโนโคนาโซล โฟพีโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล ทีบูโคนาโซล

กลุ่ม M3 /M03 หรือ Mxx; สารที่มีคุณสมบัติการเข้าสู่พืช ประเภทสัมผัส (contact)



* หลักการหนึ่งของการชะลอความต้านทานของโรคพืช





มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



Tiger Agriculture Since 2000



การระบาดของแมลง



การระบาดเพิ่มของแมลงศัตรูพืช (Pest resurgence)

หมายถึง การฟื้นกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งและจำนวนประชากรแมลงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สารกำจัดแมลง



มาร์ดูไบ

ปัจจัยการระบาดเพิ่มขึ้นของแมลงศัตรูพืช (Factor of Pest resurgence)

1. ผลกระทบต่อแมลงตัวห้ำและปรสิตจากสารเคมี (Suppression of natural enemies)
2. สารเคมีกำจัดแมลงส่งเสริมการเจริญของพืช (Insecticides-induced plant growth)
3. การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของแมลง (Physiology and biochemical effect on pest reproductive)

3.1 ผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดแมลงอัตราต่ำ (Effect of sublethal doses)

3.2 อิทธิพลต่อชีววิทยาของแมลง (Influence on insect biology)

การเพิ่มขึ้นของระดับเมตาบอลิซึมโปรตีน กรดไขมัน คาร์โบไฮเดรต ทำให้วงจรชีวิตวัยตัวอ่อนพัฒนาเร็วขึ้นและมีช่วงชีวิตตัวเต็มวัยยาวนานขึ้น อัตราการวางไข่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาการวางไข่เพิ่มขึ้น และมีสารอาหารรองรับการสืบพันธุ์ และพบว่า แมลงหลายชนิดสามารถสืบพันธุ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยการผสมพันธุ์และได้ตัวอ่อนที่เป็นเพศเมีย



แมลงและโรคศัตรูพืชที่สำคัญ



แตกใบอ่อน – ใบแก่

ระยะไข่ปลา - ติดผลอ่อน

ผลอายุ 45 วัน - เก็บเกี่ยว



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ้า




เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

ไรแดงแอฟริกัน (African red mites)

ไรแดงแอฟริกัน (African red mites: *Eutetranychus africanus* Tucker)

อันดับ Trombidiformes วงศ์ไรแดง /ไรแมงมุม Tetranychidae

ไรแดงชมพู (Rose apple red mite : *Oligonychus biharensis* Hirst), ไรแมงมุมฟิจิ (Fiji spider mite: *Tetranychus fijiensis* Hirst



- ปากเข็ม (stylets)
- ขนาดลำตัว 300-400 ไมครอน
- บางชนิดน้ำลายเป็นพิษมาก (toxin)
- อัตราส่วนเพศผู้ 1 : เพศเมีย 3-9
- เพศเมียวางไข่ 14-15 ฟอง



© Thirasak Chuchoet



คราบสีน้ำตาลคล้ายฝุ่นที่เกิดจากการลอกคราบของไร



© Thirasak Chuchoet



ซ้าย: สีใบซีด, ขวา: อาการไหม้ตามหน้าใบ พบมากช่วงขาดน้ำ



มาร์คูไบ

อาการไม้เริ่มแรกเป็นจุดเล็กๆ เนื่องจากน้ำลายไรแดง/ไรแมงมุมเป็นพิษ



ใบขีดขาว: เนื่องจากไรแดงใช้ปากที่เป็นเข็มแทงเจาะคล้ายจักรเย็บผ้า



ระบารุนแรงมากในฤดูร้อน-อากาศแห้ง ใบแก่ร่วงหล่น



มาร์คูไบ






ยาเกษตร ตราเจ้า



Tiger Agriculture Since 2000


ไรแดงแอฟริกัน (African red mites)



© Thirasak Chuchot



โรคแดงแอฟริกัน (African red mites)



© Thirasak Chuchot





สารกำจัดโรคศัตรูพืช

กลุ่ม 21A สารกำจัดโรคศัตรูพืช

ยับยั้งการขนส่งอิเล็กตรอน ที่ “คอมเพล็กซ์-1”
(Complex I inhibitors)



ขาดพลังงาน

กลุ่มสารเคมี: pyridazinones

โมทีริดา : ไพริดาเบน (pyridaben) 13.5%EC

ฮาฟท์ไมท์ : ไพริดาเบน (pyridaben) 20%WP



pH 5

400 ซีซี./200 ลิตร



pH 7

200 กรัม/200 ลิตร

หรือ ▶

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)

มีพิษข้างเคียงต่อเพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นบนขาชนิดและแมลงหวี่ขาว



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ้า



© Thirasak Chuchot



สารกำจัดโรคศัตรูพืช

กลุ่ม 12C สารกำจัดโรคศัตรูพืช

ยับยั้งเอนไซม์ “เอทีพี ซินเทส”
(inhibitors of ATP synthase)



ขาดพลังงาน

กลุ่มสารเคมี: sulfite ester

ไพโรพาร์โกต์ : ไพโรพาร์โกต์ (propargite) 20%EC



pH 5.5

400 ซีซี./200 ลิตร

*ใช้ด้วยความระมัดระวัง



* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



สารยับยั้งการเจริญเติบโตของกลุ่มไรแดง-ไรแมงมุม



กลุ่ม 10A สารกำจัดไรศัตรูพืช

ยับยั้งเอนไซม์ “โคตินซินเทส-1”
(inhibitors of CHS1)



ขาดพลังงาน

ยับยั้งเอนไซม์โคตินซินเทส-1 (CHS1)

กลุ่มสารเคมี: carboxamides

แพ็คชั่น : เฮกซีไทอะซอก (hexythiazox) 1.8% W/V EC



+ ยากำจัดไร



สารกำจัดแมลงที่มีผลกำจัดไร

กลุ่ม 1B สารกำจัดแมลง

ยับยั้งเอนไซม์ “อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส”
(AChE inhibitors)



กระตุ้นกระแสประสาท
(hyperexcitation)

กลุ่มสารเคมี: organophosphates และ Carbamates
แป็คฟอส: ไตรอะโซฟอส (triazophos) 40%EC
พีโป: ไพรฟีโนฟอส (profenofos) 50%EC



350-400 ซีซี./200 ลิตร



350-400 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



มาร์คูโบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



Tiger Agriculture Since 2000

สารกำจัดแมลงที่มีผลกำจัดไร

กลุ่ม 4A สารกำจัดแมลง

แย่งออกฤทธิ์กับสารสื่อประสาท
จับ “ตัวรับนิโคตินิกอะซิติลโคลีน”
(nAChR competitive modulators)



กระตุ้นกระแสประสาท
(hyperexcitation)

กลุ่มสารเคมี: neonicotinoids

ไทอะมีทอกแซม :

ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)

25%WG

200 กรัม/200 ลิตร

เสริมฤทธิ์กัน

pH 7.3



pH 6.7



กลุ่ม 6 สารกำจัดแมลง

กระตุ้นช่อง “กลูตาเมตคลอไรด์”
(GluCl allosteric modulators)



ลดกระแสประสาท
(Hyperpolarization)

กลุ่มสารเคมี: avermectins

โดเมทริน :


อะบาเมกติน (abamectin) 1.8%EC

300-400 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)

© Thirasak Chuchot





ไรแดงแอฟริกัน (African red mites)

สารเคมีสำหรับพ่นกำจัดไรศัตรูพืช

สลับ



มาร์ดูไบ

กลุ่ม 2B: ฟิโพรนิล 5%, 25% และ 80% “เฉพาะไรขาวเท่านั้น”

กลุ่ม 3A: ไบเฟนทรีน 2.5%, 5% และ 10% **ห้ามใช้!!** เฟนโพรพาทริน, โซเฟอร์เมทรีน

กลุ่ม 10A: เฮกซีโทอะซอก 1.8% **ยาเฉพาะไรศัตรูพืชวงศ์ไรแดง**

กลุ่ม 12B: เพนบูทาตินออกไซด์ 55%, กลุ่ม 12C: โพรพาไกต์ 20%, 30% และ 57%, กลุ่ม 12D: เตตระโดฟอน

กลุ่ม 13: คลอร์ฟิनाเพอร์ 10%, 24% และ 40% **ใช้กำจัดได้ทั้งวงศ์ไรแดง และวงศ์ไรขาว**

กลุ่ม 15: ลูเฟนบูรอน 5% **มีข้อมูลแนะนำใช้ลูเฟนบูรอนในไรศัตรูพืชวงศ์ไรสีงา "เท่านั้น"**

กลุ่ม 19: อามีทราซ 20%

กลุ่ม 20D: ไบฟิनाเซต 48%

กลุ่ม 21A: โพรดาเบน 12.5% และ 20%, ทีบูเฟนโพแรด 36%, เฟนไพร็อกซิเมต 5%, ฟินาซาควิน 20%



กลุ่ม 23: สไปโรมีซีเฟน 24% สไปโรเตตระแมก 15%, 24% และสไปโรโดโคลเฟน 24%

กลุ่ม 25: โซฟลูมีโทเฟน 20% และโซอีโนไพราเฟน 30%



เพลี้ยไฟ (Thrips)

เพลี้ยไฟ (Thrips) อันดับ: ไทซานนีออปเทอรา (Thysanoptera) วงศ์ Thripidae





มาร์คูไบ



ยาเกษตร トラเจท



เพลี้ยไฟ (Thrips) ที่พบในทุเรียน

เพลี้ยไฟดอกไม้ตะวันตก (Western flower thrips) : *Frankliniella occidentalis*

เพลี้ยไฟพริก (Chilli thrips /Yellow tea thrips) : *Scirtothrips dorsalis*


เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย (Hawaiian flower thrips) : *Thrips hawaiiensis*

เพลี้ยไฟฝ้าย (Cotton thrips /Melon thrips /Palm thrips) : *Thrips palmi*

เพลี้ยไฟดอกถั่ว (Flower bean thrips) : *Megalurothrips sjostedti*

เพลี้ยไฟหลากสี (Color thrips) : *Thrips coloratus*

เพลี้ยไฟ (Thrips)





การลอกคราบ

ตัวอ่อนของเพลี้ยไฟ โดยเฉพาะตัวอ่อนวัยแรกจะต้องการสารอาหารอย่างมาก



มาร์คูไบ



เพลี้ยไฟ ตัวเต็มวัย



© Thirasak Chuchoet



ลักษณะการทำลายของเพลี้ยไฟ มักเขียนจุดใกล้เส้นใบ



การทำลายของเพลี้ยไฟ: ใบอ่อนที่เพิ่งคลี่ใบหากถูกทำลายจะหลุดร่วง (อ่อนแอก็ก็น้ำไป)



มาร์คูไบ

การระบาดของเพลี้ยไฟ พบมากในช่วงฝนทิ้งช่วง



พฤติกรรมของเพลี้ยไฟจะเข้าและดูดกินน้ำเลี้ยงจากของอ่อน เช่น ใบอ่อน ดอก และผลอ่อน





มาร์คูไบ



ลักษณะแผลที่เกิดจากการใช้พินกรามซ้ายเย็บดอก เพื่อดูดก้นน้ำเลี้ยง



© Thirasak Chuchoet



อากาศร้อนจะหลบซ่อนตัว





© Thirasa Chuchot



ผลอ่อนถูกทำลายระยะหางแย้-ผลไข่นกกระทา เมื่อผลขยายขนาด หนาม/ร่องหนามจึงฉีกขาด



มาร์คูไบ



ยาเชตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

© Thirasak Chuchoet



ผลอ่อนถูกทำลายระยะหางแย้-ผลไข่นกกระทา เมื่อผลขยายขนาด หนาม/ร่องหนามจึงฉีกขาด

ปฏิทินการเข้าทำลายของศัตรูพืช

ระยะเวลาเจริญเติบโตของใบทุเรียน: ~ 45-60 วัน



แตกใบอ่อน (Initial stage) → 3 วัน → ใบหางปลา (Longtail leaf stage) → 7 วัน → ใบคลี่กาง (Leaf spacing stage) → 20-25 วัน → ใบเพสลาด (Mature stage) → 7-14 วัน → ใบแก่ที่สมบูรณ์ (Mature stage)





ปฏิทินการเข้าทำลายของศัตรูพืช

ระยะเก็บเกี่ยว: กระจุม ~90-100 วัน ชะนี ~100-110 วัน หนอนทอง ~110-120 วัน ก้านยาว ~115 วัน พวงมณี ~110 วัน หลิน/หลง ~110 วัน



ดอกบาน

4-7 วัน



หางแย้ไหม้

7 วัน




ไข่นกกระทา

7-10 วัน



ไข่ไก่



เพลี้ยไฟ



เพลี้ยแป้ง

ระยะวิกฤตของพืช

กระป๋องใบ

ขยายฟู

สร้างเนื้อ

เก็บเกี่ยว



มาร์คูโบ

สารกำจัดเพลี้ยไฟ-เพลี้ยไก่แจ้-หนอน-ไรขาว-ด้วง-เพลี้ยอ่อน

กลุ่ม 4A สารกำจัดแมลง



กระตุ้นกระแสประสาท
(hyperexcitation)

แย่งออกฤทธิ์กับสารสื่อประสาท
จับ “ตัวรับนิโคตินิกอะซิทิลโคลีน”
(nAChR competitive modulators)

กลุ่มสารเคมี: neonicotinoids

โทะมีทอกแซม : โทะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25%WG
ฟูเรนโน : ไดโนทีฟูเรโน (dinotefuran) 20% SG
แพ็คมิดา70 : อิมิดาโคลพริด (imidachlorpid) 70%WG
แพ็คมิดา35 : อิมิดาโคลพริด (imidachlorpid) 35%SC
แพ็คมอร์ : อะซีตามิพริด (acetamiprid) 20% SP

pH 7.7



pH 5.7



pH 7.1



pH 6.7



pH 7.0



150-200 กรัม/200 ลิตร

300-400 ซีซี.

/200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)




© Thirasak Chuchot





สารกำจัดเพลี้ยไฟ-ไรแดง-หนอน-หนอนด่าง

กลุ่ม 6 สารกำจัดแมลง



ลดกระแสประสาท
(Hyperpolarization)

กระตุ้นช่อง “กลูตามาตคลอไรด์”
(GluCl allosteric modulators)

กลุ่มสารเคมี: avermectins

โดเมทริน : อะบาเมกติน (abamectin) 1.8%EC
แพ็คกิ่ง-อี : อีมาเมกติน (emamectin) 1.92%EC
แพ็คติน : อีมาเมกติน (emamectin) 1.92%EC
ทากรี : อีมาเมกติน (emamectin) 5%SG



pH 6.7

หรือ ▶

350-500 ซีซี./200 ลิตร



pH 5.4

หรือ ▶

350-500 ซีซี./200 ลิตร



pH 5.4

หรือ ▶

350-500 ซีซี./200 ลิตร



pH 4.7

150-200 กรัม/200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



สารกำจัดเพลี้ยไฟ-หนอน-ไรขาว-ด้วง-เพลี้ยอ่อน

กลุ่ม 2B สารกำจัดแมลง

ขัดขวางช่อง “กาบาคลอไรด์”
(GABA-Cl blockers)



ไม่ยับยั้งกระแสประสาท
(hyperexcitation)

กลุ่มสารเคมี: phenylpyrazoles
เฟ็คไพรอนิล: ฟิไพรอนิล (fipronil) 5%SC



pH 7.0

300-500 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



มาร์คูไบ

สารกำจัดเพลี้ยไฟ-เพลี้ยจักจั่น-เพลี้ยไก่แจ้-เพลี้ยหอย-เพลี้ยแป้ง-หนอน ฯ

กลุ่ม 1 สารกำจัดแมลง

ยับยั้งเอนไซม์ “อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส”
(AChE inhibitors)



กระตุ้นกระแสประสาท
(hyperexcitation)

กลุ่มสารเคมี: organophosphates และ Carbamates

ฟิโม่: โพรฟิโนฟอส (profenofos) 50%EC

แพคบีพี: ฟิโนบูคาร์บ (fenobucarb) 50%EC



กลุ่ม 1B

pH 6.8

350-400 ซีซี./200 ลิตร

หรือ ▶



กลุ่ม 1A

pH 8.8

350-400 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

สารกำจัดเพลี้ยไฟ-เพลี้ยจักจั่น-เพลี้ยไก่แจ้-เพลี้ยหอย-เพลี้ยแป้ง

กลุ่ม 9B สารกำจัดแมลง

กระตุ้นการรับรู้ ช่อง “ทีอาร์พีวี”
(TRPV modulators)



กระตุ้นขยายสัญญาณการรับรู้
(stretch receptors > starvation)

กลุ่มสารเคมี: Pyridine Azomethines

แป็คโตรซีน: ไพมีโตรซีน (pymetrozine) 50%WG

pH 6.5



200 กรัม /200 ลิตร

*ถ้าไม่ทันใจ

pH 6.8



350-400 ซีซี./200 ลิตร

*ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



มาร์ดูไบ



© Thirasak Chuchoet





สารยับยั้งการเจริญเติบโตเพลี้ยไฟ-เพลี้ยจักจั่น—เพลี้ยไก่แจ้-เพลี้ยหอย-เพลี้ยแป้ง

กลุ่ม 7C สารกำจัดแมลง

กระตุ้นตัวรับ “ฮอร์โมนจูเวไนล”
(JHR modulators)



ลอกคราบก่อนวัย-ไม่เจริญเป็นตัวเต็มวัย
(inhibitors of molting)

กลุ่มสารเคมี: Pyrifroxyfen

แป็คซีเฟน: ไพริพรอกซีเฟน (pyrifroxyfen) 10%EC



pH 6.4



ยากำจัดเพลี้ยไฟ

200-300 ซีซี. /200 ลิตร


* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



มาร์คูใบ

เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน (Durian leafhopper)

เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน (Durian leafhopper: *Amrasca durianae* Hongsaprug), อันดับ Hemiptera วงศ์ Cicadellidae



วางไข่ในเนื้อใบตามเส้นใบ หรือกลางใบ




© Thirasak Chuchoet





แผลสีดำเกิดขึ้นหลังตัวอ่อนฟักออกจากไข่



ภาพซ้าย-กลาง : ตัวเต็มวัย, ภาพขวา : ตัวอ่อน



มาร์คูใบ



อาการใบอ่อนไหม้ตามขอบใบ/ปลายใบ เนื่องจากน้ำลายเป็นพิษ



ใบร่วงหล่นจนเหลือแต่ก้าน



เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน / เพลี้ยไก่ฟ้า (Durian psyllid)

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Durian psyllid : *Allocarsidara malayensis* Crawford), อันดับ Hemiptera วงศ์ Psyllidae



ไข่ (ฝังในใบ)



ตัวอ่อน 5 วัน



~ 10-34 วัน

ตัวเต็มวัย ~ 60 วัน



เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน / เพลี้ยไก่ฟ้า (Durian psyllid)



มาร์ดูใบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



Tiger Agriculture Since 2000



© Thirasak Chuchoet



ตัวอ่อนถ่ายมูลเหนียว รสหวาน เป็นอาหารของเชื้อราดำ



การเจาะดูดกินน้ำเลี้ยงของตัวอ่อน ทำให้ใบไม่ขยายและใบบิดงอ



ตัวเต็มวัย ยังไม่แน่ชัดว่าทำลายพืชมากน้อยเพียงใด



มาร์คูไบ

สารกำจัดเพลี้ยไฟ-เพลี้ยจุกจัน-เพลี้ยไก่แจ้-เพลี้ยหอย-เพลี้ยแป้ง-หนอน

กลุ่ม 9B สารกำจัดแมลง

กระตุ้นขยายสัญญาณการรับรู้
(stretch receptors > starvation)

กลุ่ม 1 สารกำจัดแมลง

กระตุ้นการรับรู้ ช่อง “ทีอาร์พีวี”
(TRPV modulators)

กระตุ้นกระแสประสาท
(hyperexcitation)

ยับยั้งเอนไซม์ “อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส”
(AChE inhibitors)

กลุ่มสารเคมี: Pyridine Azomethines

กลุ่มสารเคมี: -

แฟ็คโทรซีน: ไพมีโทรซีน (pymetrozine) 50%WG

ฟีโป: โพรฟีโนฟอส (profenofos) 50%EC

แฟคบีพี: ฟีนอบุคาร์บ (fenobucarb) 50%EC

pH 6.5



200 กรัม /200 ลิตร

pH 6.8



กลุ่ม 1B



pH 8.8

กลุ่ม 1A



หรือ ▶

350-400 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



© Thirasak Chuchoet






สารกำจัดเพลี้ยไฟ-เพลี้ยจักจั่น-เพลี้ยไก่แจ้-เพลี้ยหอย-เพลี้ยแป้ง-หนอน

กลุ่ม 7C สารกำจัดแมลง

กระตุ้นตัวรับ “ฮอร์โมนจูเวไนล”
(JHR modulators)

กลุ่มสารเคมี: Pyrifroxyfen

แอ็คซีเฟน: ไพริฟรอกซีเฟน (pyrifroxyfen) 10%EC



ไม่เจริญเป็นตัวเต็มวัย
(inhibitors of molting)

กระตุ้นกระแสประสาท
(hyperexcitation)



กลุ่ม 1 สารกำจัดแมลง

ยับยั้งเอนไซม์ “อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส”
(AChE inhibitors)

กลุ่มสารเคมี: -

ฟิโป: โพรฟีโนฟอส (profenofos) 50%EC

แฟคบีพี: ฟิโนบูคาร์บ (fenobucarb) 50%EC

pH 6.4



250-300 ซีซี./200 ลิตร

pH 6.8



pH 8.8



หรือ ▶

350-400 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



เพลี้ยแป้ง (Mealybugs): เพลี้ยแป้งทำฟาร์มมด



© Thirasak Chuchoet



เพลี้ยแป้ง (Mealybugs) อันดับ Hemiptera วงศ์ใหญ่ Coccoidae



มาร์คูไบ



เพลี้ยแป้งในทุเรียนพบมากกว่า 2-5 ชนิด เช่น เพลี้ยแป้งกาแฟ เพลี้ยแป้งแปซิฟิก เพลี้ยแป้งลายจุด เพลี้ยแป้งเจบี



เพลี้ยแป้งทำลายมูลหนึ่ยว รสหวาน เป็นอาหารของเชิ่รดำ



เพลี้ยหอยเกล็ดกุเรียน หรือเพลี้ยหอยปุยฝ้าย (Armored scales)

เพลี้ยหอยเกล็ดกุเรียน / เพลี้ยหอยปุยฝ้าย (Armored scales: *Aulacaspis vitis* Green), อันดับ Hemiptera วงศ์ Diaspididae



สร้างไขปกคลุมตัวเป็นเส้นใย ไขของเพลี้ยแป้ง-เพลี้ยหอยเป็นเกาะป้องกันยาแมลง

© Thirasak Chuchot





มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



Tiger Agriculture Since 2000

เพลี้ยหอยเกล็ดทำฟาร์มมด



© Thirasak Chuchoet



เพลี้ยหอยใช้บริการเกร็บบไค้จากมดเช่นเดียวกับเพลี้ยแป้ง



เพลี้ยหอยเกล็ดทุเรียน อาจทำให้กิ่งเล็กๆ แห้งตายได้



© Thirasak Chuchoet



มักเข้าทำลายตามกิ่ง ชั่วผล มากกว่าใบ





มาร์คใบ

เพลี้ยหอยเกล็ดมะม่วง หรือเพลี้ยนาสาร (White mango scale)

เพลี้ยหอยเกล็ดมะม่วง (White mango scale: *Aulacaspis tubercularis* Newstead), อันดับ Hemiptera วงศ์ Diaspididae



ยาเกษตร ตราเจ็ด



© Thirasak Chuchoet



พบตามหน้าใบทุเรียน มะม่วง



ทำให้หน้าใบเหลืองเป็นจุดตามหน้าใบ



เพลี้ยหอยรัสเซลล์ หรือเพลี้ยหอยใต้ใบ (Pit Scales)

เพลี้ยหอยรัสเซลล์ (*Asterolecanium unguatum* Russell), อันดับ Hemiptera วงศ์ Asterolecaniidae



มีถิ่นกำเนิดในเขตภาคใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดฯ

© Thirasak Chuchot





มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

เพลี้ยหอยรัสเซีย หรือเพลี้ยหอยใต้ใบ (Pit Scales)



© Thirasak Chuchoet



อาศัยเกาะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบ

เพลี้ยหอยรัสเซียหรือเพลี้ยหอยใต้ใบ (Pit Scales)



ทำให้เกิดราดำ



© Thirasak Chuchoet





หน้าใบเหลืองเป็นจุด และใบหมดอายุเร็วกว่าปกติ



มาร์คูไบ



ทุเรียนเล็กที่ขาดการดูแล จะพบยอดอ่อนถูกเข้าทำลาย ต้นโตช้า ต้นเล็กและแคระแกร็น



ด้านซ้ายสีเหลือง คือราเหลือง *Hypocrella* spp. กินซากมากกว่ากินตัวมีชีวิต



สารกำจัดเพลี้ยไฟ-เพลี้ยจักจั่น-เพลี้ยไก่แจ้-เพลี้ยหอย-เพลี้ยแป้ง-หนอน



กลุ่ม 9B สารกำจัดแมลง

กระตุ้นขยายสัญญาณการรับรู้ (stretch receptors > starvation)

กระตุ้นการรับรู้ ช่อง “ทีอาร์พีวี” (TRPV modulators)

กลุ่มสารเคมี: Pyridine Azomethines

แอพิคโตรซีน: ไพมีโตรซีน (pymetrozine) 50%WG



200 กรัม /200 ลิตร

กลุ่ม 1 สารกำจัดแมลง

กระตุ้นกระแสประสาท (hyperexcitation)

ยับยั้งเอนไซม์ “อะซีทิลโคลีนเอสเตอเรส” (AChE inhibitors)

กลุ่มสารเคมี: -

ฟีโป: โพรฟีโนฟอส (profenofos) 50%EC

แฟคบีพี: ฟีนอบุคาร์บ (fenobucarb) 50%EC



pH 6.8



pH 8.8

หรือ ▶



350-400 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



มาร์คูไบ

สารกำจัดเพลี้ยไฟ-เพลี้ยจักจั่น-เพลี้ยไก่แจ้-เพลี้ยหอย-เพลี้ยแป้ง-หนอน

กลุ่ม 7C สารกำจัดแมลง

กระตุ้นตัวรับ “ฮอร์โมนจูเวไนล”
(JHR modulators)

กลุ่มสารเคมี: Pyrifroxyfen

แอ็คซีเฟน: ไพริฟรอกซีเฟน (pyrifroxyfen) 10%EC

ไม่เจริญเป็นตัวเต็มวัย
(inhibitors of molting)

กระตุ้นกระแสประสาท
(hyperexcitation)

กลุ่ม 1 สารกำจัดแมลง

ยับยั้งเอนไซม์ “อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส”
(AChE inhibitors)

กลุ่มสารเคมี: -

ฟิโป: โพรฟีโนฟอส (profenofos) 50%EC

แฟคบีพี: ฟิโนบูคาร์บ (fenobucarb) 50%EC

pH 6.4



250-300 ซีซี./200 ลิตร

pH 6.8



pH 8.8



350-400 ซีซี./200 ลิตร



หรือ ▶

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



© Thirasak Chuchot



สารกำจัดเพลี้ยจักจั่น-เพลี้ยไก่แจ้-เพลี้ยหอย-เพลี้ยแป้ง-มวน

กลุ่ม 16 สารกำจัดแมลง

ยับยั้งเอนไซม์ “ไคติน”
(inhibitors of Chitin, type 1)



ยับยั้งลอกคราบ-คุมไข่
(inhibitors of molting-Transovarial)

กลุ่มสารเคมี: Pyrifroxyfen

แพ็คบูชิน : บuprofezin (buprofezin) 40%SC



pH 7.4

300-400 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท

© Thirasak Chuchoet





หนอนเจาะผลทุเรียน หรือหนอนเจาะผลละหุ่ง (Yellow peach moth)

หนอนเจาะผลทุเรียน (Yellow peach moth: *Conogethes punctiferalis* Guenee), อันดับ Lepidoptera วงศ์ Crambidae



ด้กแด้



มาร์คใบ



ยาเกษตร ตราเจ้า



หนอนเจาะผลทุเรียน หรือหนอนเจาะผลละหุ่ง (Yellow peach moth)



© Thirasak Chuchoet



ตัวหนอนเมื่อแรกฟักจะมีขนาดเล็กมาก



ระยะแรกจะเจาะกินบริเวณผิวเปลือก ต่อมาจึงเจาะกินเนื้อ



หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หรือหนอนใต้ / หนอนรู (Durian seed borer)

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (Durian seed borer: *Mudaria luteileprosa* Holloway), อันดับ Lepidoptera วงศ์ Noctuidae



© Thirasak Chuchoet





มาร์คูไบ



ระยะแรกจะเจาะกินบริเวณผิวเปลือก ต่อมาจึงเจาะกินเมล็ด ลำตัวมีสีชมพูเข้มถึงแดง



มีปากคล้ายคีมหนีบ



รูเป็ยก กับรูแห้ง



มาร์คูไบ

หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น-กิ่ง (Durian stem borer)

ด้วงบ่าหนามจุดบนดำ (Durian stem borer: *Batocera rufomaculata* De Geer), อันดับ Coleoptera วงศ์ Cerambycidae



ยาเกษตร ตราเจ้า



มีปากคล้ายคีมหนีบที่แข็งแรงมาก

© Thirasak Chuchoet





เจาะถึงเป็นทางยาวได้หลายเมตร ถ้าเจาะวนรอบต้นจะทำให้ต้นตาย



ดักด้วยตาข่ายตามพฤติกรรมของด้วง



มาร์คูไบ

หนอนเจาะดอกบางชนิด



หนอนกระทู้ผัก (Common cutworm)



หนอนกระทู้ผัก (Common cutworm: *Spodoptera litura* Fabricius) วงศ์: นีอกทุยดี (Family: Noctuidae)
อันดับ: หนอนผีเสื้อ หรือเลพิติอพเทอร่า (Order: Lepidoptera)



หนอนบุ้ง หรือหนอนร่าน





มาร์คูไบ



ยาเชตร トラเจท



หนอนบุ้ง หรือหนอนร่าน



© Thirasak Chuchoet





หนอนบู่ หรือหนอนร่าน



มาร์ดูใบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



© Thirasak Chuchoet



หนอนบู่ หรือ หนอนร่าน



หนอนคืบ



หนอนกระทุ้



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ้า



หนอนม้วนใบบางชนิด



© Thirasak Chuchoet



สารกำจัดหนอน-มด

กลุ่ม 22A สารกำจัดแมลง

ขัดขวางช่อง “ศักย์โซเดียม”
(Na⁺ channel blockers)



ลดกระแสประสาท
(hyperpolarization)

กลุ่มสารเคมี: oxadiazines

สตาร์กี้ : อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15%SC

pH 5.8



100-150 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



มาร์คูไบ




ยาเกษตร ตราเจ็ท



สารกำจัดหนอน-หนอนด้วง

กลุ่ม 3A สารกำจัดแมลง



กระตุ้นกระแสประสาท (hyperexcitation)

กระตุ้นช่อง “ศักย์โซเดียม” (Na⁺ channel modulators)
กลุ่มสารเคมี: pyrethroids

ไฮเตอร์35 : ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 35%EC
ไฮเตอร์โกลด์ : ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 20%EW
แพ็คเคลต้า : เดลตามาทริน (deltamethrin) 3%EC
แพ็คแลมป์ : แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 2.5%EC



pH 5.1

pH 8.8

หรือ ▶



หรือ ▶



pH 6.7

หรือ ▶



pH 6.4

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)

200-300 ซีซี./200 ลิตร



มาร์คูไบ

สารกำจัดเพลี้ยไฟ-หนอน-ด้วง-มวน-แมลงสิง-มด

กลุ่ม 4A สารกำจัดแมลง

แย่งออกฤทธิ์กับสารสื่อประสาท
จับ “ตัวรับนิโคตินิกอะซิทิลโคลีน”
(nAChR competitive modulators)



กระตุ้นกระแสประสาท
(hyperexcitation)

กลุ่ม 3A สารกำจัดแมลง

กระตุ้นช่อง “ศักย์โซเดียม”
(Na⁺ channel modulators)



กระตุ้นกระแสประสาท
(hyperexcitation)

กลุ่มสารเคมี: neonicotinoids

กลุ่มสารเคมี: pyrethroids

แพ็คดำ : ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 14.1% +
แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 10.6%ZC



50-100 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



© Thirasak Chuchot





สารกำจัดเพลี้ยไฟ-ไรแดง-หนอน-หนอนด่าง

กลุ่ม 6 สารกำจัดแมลง

ลดกระแสประสาท (Hyperpolarization)

กระตุ้นช่อง “กลูตามาตคลอไรด์” (GluCl allosteric modulators)

กลุ่มสารเคมี: avermectins

โดเมทริน : อะบาเมกติน (abamectin) 1.8%EC
แพ็คกิ่ง-อี : อีมาเมกติน (emamectin) 1.92%EC
แพ็คติน : อีมาเมกติน (emamectin) 1.92%EC
ทากรี : อีมาเมกติน (emamectin) 5%SG



pH 6.7

หรือ ▶



pH 5.4

หรือ ▶



pH 5.4

หรือ ▶



pH 4.7

350-500 ซีซี./200 ลิตร

350-500 ซีซี./200 ลิตร

350-500 ซีซี./200 ลิตร

150-200 กรัม/200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)

สารกำจัดเพลี้ยไฟ-เพลี้ยจักจั่น-เพลี้ยหอย-เพลี้ยแป้ง-หนอน ฯ



กลุ่ม 1 สารกำจัดแมลง

ยับยั้งเอนไซม์ “อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส”
(AChE inhibitors)



กระตุ้นกระแสประสาท
(hyperexcitation)

กลุ่มสารเคมี: -

ฟิโม่: โพรฟิโนฟอส (profenofos) 50%EC

แพคบีพี: ฟิโนบูคาร์บ (fenobucarb) 50%EC



350-400 ซีซี./200 ลิตร

หรือ ▶



350-400 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)

สารกำจัดเพลี้ยไฟ-หนอน-ไรขาว-ด้วง-เพลี้ยอ่อน



มาร์คใบ



ยาเกษตร ตราเจ้า



กลุ่ม 2B สารกำจัดแมลง

ขัดขวางช่อง “กาบาคลอไรด์”
(GABA-Cl blockers)



ไม่ยับยั้งกระแสประสาท
(hyperexcitation)

กลุ่มสารเคมี: phenylpyrazoles

เฟ็คโปรนิล: ฟิพรอนิล (fipronil) 5%SC



pH 7.0

300-500 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)

ด้วงกัดใบชนิดต่างๆ



เพลี้ยกระโดดโกโก้ หรือเพลี้ยกระโดดปีกหุบขาว



© Thirasak Chuchoet



ตัวอ่อน

เพลี้ยกระโดดโกโก้ (White moth cicada; *Lawana conspersa* Walker) วงศ์เพลี้ยกระโดดรูปลิ้น Flatidae อันดับ Hemiptera



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ้า



© Thirasak Chuchoet



สัตว์ศัตรูพืช





สารกำจัดเพลี้ยไฟ-เพลี้ยจักจั่น-เพลี้ยหอย-เพลี้ยแป้ง-หนอน-ไล่สัตว์



กลุ่ม 1 สารกำจัดแมลง

ยับยั้งเอนไซม์ “อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส”
(AChE inhibitors)



กระตุ้นกระแสประสาท
(hyperexcitation)

กลุ่มสารเคมี: organophosphates

ฟีเอท50: เฟนโทเอต (phenthoate) 50%EC



ไล่สัตว์ฟันแทะ-ค้างคาว
ผีเสื้อมวนหวาน

200-300 ซีซี./200 ลิตร

* ค่า pH เมื่อผสมน้ำที่ความเข้มข้น 1% (200 ก.หรือซีซี./น้ำ 20 ลิตร)



โรคพืชที่สำคัญ



แตกใบอ่อน – ใบแก่

ระยะไข่ปลา - ติดผลอ่อน

ผลอายุ 45 วัน - เก็บเกี่ยว



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ้า



Tiger Agriculture Since 2000

สิ่งมีชีวิต ; เชื้อรา (Fungi disease)

การจำแนกเชื้อรา (แบบสมัยตอนผมเรียน)

ราชั้นต่ำ (Lower fungi)

Class: Myxomycetes (ราเมือก) ไม่มีผนังเซลล์ รูปร่างไม่แน่นอน

Class: Phycomycetes (สาหร่าย & ราสนิมขาว, ราน้ำค้าง lower true fungi)

Subclass: Chytridiomycetes

Subclass: Oomycetes (ราน้ำ, ราสนิมขาว, ราน้ำค้าง, รากเน่าโคนเน่า)

Subclass: Zygomycetes (ราขนมปัง, โรคเน่า, โรคราเงาหลังการเก็บเกี่ยว, โรคราน้ำค้าง)

ราชั้นสูง (Higher fungi)

Class: Ascomycetes สืบพันธุ์อาศัยเพศ สร้าง ascospores

subclass: Hemiascomycetes

subclass: Euascomycetes โรคราแป้ง ใบจุด ใบไหม้ เมลาโนส แอนแทรคโนส

Class: Deuteromycetes (Imperfect fungi) ใบจุด ใบไหม้ สแคป แอนแทรคโนส

Class: Basidiomycetes

Subclass: Heterobasidiomycetes โรคราเงา ราสนิม

Subclass: Homobasidiomycetes โรคราสีชมพู ใบไหม้ ใบติด รากเน่า


เกิดการแบ่งสารป้องกันกำจัดโรคพืช เป็น 2 กลุ่ม และเกิดความเชื่อตามมา

สารป้องกันกำจัดราชั้นต่ำ

สารป้องกันกำจัดราชั้นสูง

เชื้อคล้ายรา: โฟทอปธอรา (*Phytophthora palmivora*)

rosette type
colony



sporangium



PhyC

PhyD

PhyM



พ่นน้ำตาลทางด่วนเป็น
อาหารเชื้อราไฟทอปฯ

ภาพที่ 17 สัณฐานของโคโลนี และ sporangium ของเชื้อ *Phytophthora* sp. ที่แยกได้จากทุเรียนพันธุ์ชะนี (PhyC) กระจุม (PhyD) และหมอนทอง (PhyM)



สารยับยั้งเชื้อคล้ายรา: โฟทอปธอรา (*Phytophthora palmivora*)



การทดสอบยับยั้งเชื้อราด้วยวิธีอาหารพิษ (poisoned food) ที่ค่าความเข้มข้นลดลงครึ่งหนึ่ง

ตารางที่ 6 เพอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *Phytophthora* sp. จากทุเรียน จำนวน 3 ไอโซเลท ของสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชที่ระดับความเข้มข้นครึ่งหนึ่งของอัตราแนะนำ

สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช (ความเข้มข้น ppm)	เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโต (%) ¹		
	PhyC	PhyD	PhyM
5. difenoconazole + propiconazole (112.50)	89.33	83.30	84.23
9. cymoxanil + mancozeb (900)	100.00	100.00	100.00
10. mancozeb + valifenalate (825)	100.00	100.00	100.00
12. quintozone + etridiazole (300)	100.00	100.00	100.00
13. etridiazole (180)	100.00	100.00	100.00

หมายเหตุ ^{1/} เพอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโต เป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากการทดลอง 5 ซ้ำ





มาร์คูใบ

สารยับยั้งเชื้อคล้ายรา: โฟทอปธอรา (*Phytophthora palmivora*)

การทดสอบยับยั้งเชื้อราด้วยวิธีอาหารพิษ (poisoned food) โดยคัดเลือกยาที่ไม่ผ่านเกณฑ์

การทดสอบตามอัตราแนะนำมาทดสอบอีกครั้ง ที่ค่าความเข้มข้นเพิ่มขึ้น 1 เท่า



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000



สารยับยั้งเชื้อคล้ายรา: โฟทอปธอรา (*Phytophthora palmivora*)



กลุ่ม 3

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-150 ซีซี.
ต่อน้ำ 200 ลิตร



กลุ่ม 11

ยับยั้งเอนไซม์ “ยูบิควินอล ออกซิเดส”
(Cyt. bc1 inhibitors)

150-200 ซีซี.
ต่อน้ำ 200 ลิตร



กลุ่ม 11+3

ยับยั้งเอนไซม์ “ยูบิควินอล ออกซิเดส”
(Cyt. bc1 inhibitors)

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

150-200 ซีซี.
ต่อน้ำ 200 ลิตร



กลุ่ม 27+M03

ไม่ทราบกลไก (Unknown)
หลายกลไก (Multiple)

25-50 กรัม
ต่อน้ำ 200 ลิตร



กลุ่ม 4

ยับยั้งเอนไซม์ “อาร์เอ็นเอ
พอลิเมอเรส 1”
(RNA polymerase1
inhibitors)

50 กรัม
ต่อน้ำ 200 ลิตร



กลุ่ม P07

ชักนำภูมิคุ้มกัน
(Plant defence induction)

100 กรัม
ต่อน้ำ 200 ลิตร





ตัวอย่างการพ่นยากับเชื้อราชั้นสูง-เชื้อราชั้นต่ำ



โรคใบไหม้มันฝรั่ง มะเขือเทศ เชื้อราสาเหตุ: *Phytophthora infestans*



10-12 ปี ที่แล้วผมแนะนำ 2 ตัวนี้



ความเชื่อ เดิม
ใช้ผลคัดผิว
ผลไม้เท่านั้น
และราชั้นสูง



ความเชื่อเดิม
ใช้ในนาข้าวผล
เท่านั้น
รวงข้าวเหลือง
และราชั้นสูง

โรคใบไหม้ /โรคใบจุดตาเสือเผือก เชื้อราสาเหตุ: *Phytophthora colocasiae*



8-9 ปี ที่แล้วผมแนะนำ 2 ตัวนี้



ความเชื่อเดิม
ใช้กับราชั้นสูง





มาร์คูไบ

โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคใบไหม้สีดำ และโรคผลเน่า

โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคใบไหม้สีดำ และโรคผลเน่า (ชั้น (Class): Oomycetes)



เชื้อ: ไฟทอปธอรา พาล์มไมวอรา (*Phytophthora palmivora*)

เชื้อ: พิตเทียม คูเคอร์บิตาซีรัม (*Pytium cucurbitacearum*)

เชื้อ: พิตเทียม ดีไลเซนซ์ (*Pytium delicense*)

เชื้อ: พิตเทียม อินฟลาตัม (*Pytium inflatum*)

เชื้อ: พิตเทียม สเปเดนส์ (*Pytium splendens*)

เชื้อ: ไฟโตพิตเทียม เวซานส์ (*Phytopythium vexans*)



โรคน้ำคอดิน (Damping-off: *Phytophthora palmivora*)

โรคน้ำคอดิน (Damping-off: *Phytophthora palmivora*)





โรครากเน่าโคนเน่า (Root and stem Rot)

โรครากเน่าโคนเน่า (Root and stem Rot: *Phytophthora palmivora*)





มาร์คูไบ







ยาเกษตร ตราเจ้า



มาร์คูโบ









มาร์คูไบ







ยาเกษตร ตราเจ้า



มาร์คูไบ







โรคใบไหม้สีดำ (Black blight of leaf)

โรคใบไหม้สีดำ (Black blight of leaf : *Phytophthora palmivora*)





มาร์คูโบ









มาร์คูไบ

โรคดอกเน่า (Flower rot)

โรคดอกเน่า (Flower rot: *Phytophthora palmivora*)



ยาเกษตร ตราเจ้า



Tiger Agriculture Since 2000

© Thirasak Chuchoet





โรคผลเน่า (Flower rot: *Phytophthora palmivora*)

โรคผลเน่า (Flower rot: *Phytophthora palmivora*)





โรคกิ่งแห้งตาย (Die-back: *Fusarium* spp.)

โรคกิ่งแห้งตาย (Die-back: *Fusarium solani* และ *Fusarium incarnatum* [Perfect stage: Nectria])





มาร์คูไบ







ยาเกษตร ตราเจ้า



มาร์คูโบ







ยาเวชตรอากาศ



มาร์คไพบ



ยาเชตร トラเจท



Tiger Agriculture Since 2000

© Thirasak Chuchoet





© Thirasak Chuchot





โรคผลเน่า (Fusarium fruit rot: *Fusarium* spp.)

โรคผลเน่า (Fusarium fruit rot: *Fusarium solani* และ *Fusarium incarnatum* [Perfect stage: Nectria])



เดา!!



มาร์คูโบ

เดา!!

เดา!!





กลุ่ม : 27+M03
pH 6.0



กลุ่ม : 4
pH 7.0



กลุ่ม : 4
pH 3.2



การป้องกันกำจัด...





มาร์ดู่ใบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



Tiger Agriculture Since 2000



กลุ่ม : 3

pH 6.0

20-30 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร



สลับ



กลุ่ม : 11

pH 6.4

20-30 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร

© Thirasak Chuchoet







การจัดการทางดิน: ลดต้นต่อเชื้อก่อโรค



กลุ่ม : 27+M03

pH 6.0

ไม่ทราบกลไก (Unknown)

หลายกลไก (Multiple)

250-500 กรัม/200 ลิตร

ตัดแต่งกิ่ง เพื่อลดการระบาดของต้น



มาร์คูไบ



กลุ่ม : 27+M03 สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ดีโฟรา

ชื่อสามัญ :
ไซมอกซานิล (cymoxanil) +
แมนโคเซบ (mancozeb)

ผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคพืช - 370-2560 สารป้องกันกำจัดโรคพืช 28 ธ.ค. 2560

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

ชื่อการค้า : ดีโฟรา (Difora) - 370-2560 (Difora) (Difora) 27+M03

กลุ่ม : 27+M03

pH 6.0

ไม่ทราบกลไก (Unknown)

หลายกลไก (Multiple)

250-500 กรัม/200 ลิตร



กลุ่ม : 27+M03

pH 6.0

หรือ

500 กรัม.

สลับ



กลุ่ม : 3

pH 6.0

หรือ

100-150 ซีซี.

สลับ



กลุ่ม : 11

pH 6.4

หรือ

150-200 ซีซี.

สลับ



กลุ่ม : 11+3

pH 7.9

150-200 ซีซี.

พ่นให้ทั่วโคน/เต็มพื้นที่ (อย่าลืมเสริมสารกระตุ้นราก!!)



กลุ่ม : 27+M03

pH 6.0

ไม่ทราบกลไก (Unknown)

หลายกลไก (Multiple)

250-500 กรัม/200 ลิตร



มาร์คูไบ



กลุ่ม : 27+M03

pH 6.0

ไม่ทราบกลไก (Unknown)

หลายกลไก (Multiple)

250-500 กรัม/200 ลิตร



© Thirasak Chuchoet



กลุ่ม : 27+M03

pH 6.0

ไม่ทราบกลไก (Unknown)

หลายกลไก (Multiple)

250-500 กรัม/200 ลิตร





กลุ่ม : 27+M03

pH 6.0

ไม่ทราบกลไก (Unknown)
หลายกลไก (Multiple)

250-500 กรัม/200 ลิตร



มาร์คูไบ



กลุ่ม : 27+M03

pH 6.0

ไม่ทราบกลไก (Unknown)

หลายกลไก (Multiple)

250-500 กรัม/200 ลิตร





โรคราสีชมพู (Pink Disease: *Erythricium* sp.)

โรคราสีชมพู (Pink Disease: *Erythricium salmonicolor* Berk & Br. หรือ *Corticium salmonicolor* Berk & Br.)



กลุ่ม : 3

pH 8.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

200-300 ซีซี./200 ลิตร




กลุ่ม : 1

pH 5.8

ยับยั้งรวมสาย “ทูบูลิน”
(Tubulin polymerization)

200-300 ซีซี./200 ลิตร





โรคราสีชมพู (Pink Disease: *Erythricium* sp.)

โรคราสีชมพู (Pink Disease: *Erythricium salmonicolor* Berk & Br. หรือ *Corticium salmonicolor* Berk & Br.)



กลุ่ม : 3

pH 8.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

200-300 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : 1

pH 5.8

ยับยั้งรวมสาย “ทูบูลิน”
(Tubulin polymerization)

200-300 ซีซี./200 ลิตร



มาร์คูใบ

โรคราใบติดทุเรียน (Durian Leaf Blight: *Rhizoctonia* sp.)

โรคราใบติดทุเรียน (Durian Leaf Blight: *Rhizoctonia solani* Kuehn)



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000



กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร

© Thirasak Chuchot





กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



มาร์คูไบ

กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร





กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



มาร์คใบ

โรคใบจุด-ขอบใบไหม้ ในทุเรียน (Phomopsis Leaf Spot)

โรคใบจุดในทุเรียน (Phomopsis Leaf Spot: *Phomopsis durionis* หรือ *Phomopsis* spp.)



ยาเกษตร ตราเจ็ท



Tiger Agriculture Since 2000

© Thirasak Chuchoet





กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : 3

pH 7.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร





หรือ ▶

กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : 3

pH 7.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



มาร์คูไบ



กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : 3

pH 7.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : 3

pH 7.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร





กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : 3

pH 7.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)


100-200 ซีซี./200 ลิตร



มาร์คูใบ

โรคใบไหม้แอนแทรคโนส ในทุเรียน (Antracnose leaf blight)

โรคใบไหม้แอนแทรคโนส (Antracnose leaf blight: *Colletotrichum zibethinum* Sacc. หรือ *C. durionis*, *C. gloeosporioides* และ *C. gigasporum*)



โรคใบไหม้แอนแทรคโนส (Antracnose leaf blight)



ผลใบไหม้ไม่ชัดเจน
แผลไหม้เกิดขึ้นได้ทั้งปลายใบ ขอบใบ

โรคใบไหม้แอนแทรคโนส (Antracnose leaf blight)



ในภาวะร้อนและพืชขาดน้ำ ทำให้ใบเสื่อมอายุเร็วขึ้น
ส่งผลให้ภูมิต้านทานเชื้อรา “คอลเล็กโตทริกัม” ลดลง
หากโรครุนแรงสามารถทำให้ใบแก่หลุดร่วงได้อย่างรวดเร็ว

โรคใบไหม้แอนแทรคโนส (Antracnose leaf blight)



กลุ่ม : 3

pH 7.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : M03

pH 7.0

300-400 กรัม/200 ลิตร

© Thirasak Chuchoet





มาร์คูใบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



กลุ่ม : 3

pH 7.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : M03

pH 7.0

300-400 กรัม/200 ลิตร

© Thirasak Chuchoet





กลุ่ม : 3

pH 7.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร



กลุ่ม : M03

pH 7.0

300-400 กรัม/200 ลิตร



โรคผลนำแอนแทรคโนส ในทุเรียน (Antracnose)

โรคผลนำ-แอนแทรคโนส (Antracnose leaf blight: *Colletotrichum zibethinum* Sacc. หรือ *C. durionis* หรือ *C. gloeosporioides*)





มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



Tiger Agriculture Since 2000

โรคผลเน่า (Phomopsis fruit rot)

โรคผลเน่า (Phomopsis fruit rot: *Phomopsis durionis* หรือ *Phomopsis* spp.)

ไม่มีภาพประกอบ



โรคน้ำเน่า (Lasiodiplodia fruit rot)

โรคน้ำเน่า (Lasiodiplodia fruit rot: *Lasiodiplodia theobromae*)







มาร์คูใบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

การป้องกัน และกำจัดโรคพืช (กลุ่ม 11, 3 และ M)



กลุ่ม : 11

pH 6.4

ยับยั้งเอนไซม์ “ยูบิควินอล ออกซิเดส”
(Cyt. bc1 inhibitors)

150-200 ซีซี./ 200 ลิตร



กลุ่ม : 11+3

pH 7.9

ยับยั้งเอนไซม์ “ยูบิควินอล ออกซิเดส”
(Cyt. bc1 inhibitors)

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

150-200 ซีซี./ 200 ลิตร



กลุ่ม : 3

pH 7.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร

หรือ ▶



กลุ่ม : 3

pH 6.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

100-200 ซีซี./200 ลิตร

หรือ ▶



กลุ่ม : 3

pH 8.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

200-300 ซีซี./200 ลิตร



โรคราแป้ง (Powdery mildew: *Pseudoidium* sp.)

โรคราแป้ง (Powdery mildew: *Pseudoidium nephelii* เดิมชื่อ *Oidium nephelii*) ชั้น Leotiomycetes วงศ์ Erysiphaceae จีนิส Erysiphe





กลุ่ม : 3

pH 8.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

200-300 ซีซี./200 ลิตร

หรือ ▶



กลุ่ม : 11+3

pH 7.9

ยับยั้งเอนไซม์ “ยูบิควินอล ออกซิเดส”
(Cyt. bc1 inhibitors)

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

150-200 ซีซี./ 200 ลิตร



กลุ่ม : M03

pH 7.0

300-400 กรัม/200 ลิตร



มาร์ดู่ใบ



กลุ่ม : 3

pH 8.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

200-300 ซีซี./200 ลิตร

หรือ ▶



กลุ่ม : 11+3

pH 7.9

ยับยั้งเอนไซม์ “ยูบิควินอล ออกซิเดส”
(Cyt. bc1 inhibitors)

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

150-200 ซีซี./ 200 ลิตร



กลุ่ม : M03

pH 7.0

300-400 กรัม/200 ลิตร



กลุ่ม : 3

pH 8.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

200-300 ซีซี./200 ลิตร

หรือ ▶



กลุ่ม : 11+3

pH 7.9

ยับยั้งเอนไซม์ “ยูบิควินอล ออกซิเดส”
(Cyt. bc1 inhibitors)

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

150-200 ซีซี./ 200 ลิตร



กลุ่ม : M03

pH 7.0

300-400 กรัม/200 ลิตร



ยาเกษตร ตราเจ็ท



กลุ่ม : 3

pH 8.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

200-300 ซีซี./200 ลิตร

หรือ ▶



กลุ่ม : 11+3

pH 7.9

ยับยั้งเอนไซม์ “ยูบิควินอล ออกซิเดส”
(Cyt. bc1 inhibitors)

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

150-200 ซีซี./ 200 ลิตร



กลุ่ม : M03

pH 7.0

300-400 กรัม/200 ลิตร





มาร์คใบ



กลุ่ม : 3

pH 8.0

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

200-300 ซีซี./200 ลิตร

หรือ ▶



กลุ่ม : 11+3

pH 7.9

ยับยั้งเอนไซม์ “ยูบิควินอล ออกซิเดส”
(Cyt. bc1 inhibitors)

ยับยั้งเอนไซม์ “ซี14-ดีเมทิลเลส”
(C14-demethylase inhibitors)

150-200 ซีซี./ 200 ลิตร




กลุ่ม : M03

pH 7.0

300-400 กรัม/200 ลิตร

โรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย (Nematodes)



ไส้เดือนฝอย (Nematodes)

— ไส้เดือนฝอยรากแฉก (Lesion nematodes: *Pratylenchus* spp.) —



อาการใบเหลืองคล้ายอาการขาดธาตุ แต่มีความแตกต่าง



มาร์คูไบ







ยาเกษตร ตราเจ้า



มาร์คูโบ







มาร์คูโบ





© Thirasak Chuchot







มาร์คูไบ





การป้องกันและกำจัดไส้เดือนฝอย

การกำจัดไส้เดือนฝอย



400-500 ซีซี./200 ลิตร



500 ซีซี./200 ลิตร



500 ซีซี./200 ลิตร

➡ อย่าลืม!! เสริม
สารกระตุ้นรากใหม่



การป้องกันไส้เดือนฝอย ➡

หว่านป้องกันหลังลงต้นกล้า



ผู้ใช้งานและผู้ปฏิบัติงาน



ลูกน้องโรยปุ๋ยโบรอนที่เหลืองกันกระสอบ (ปุ๋ยใส่ปาล์ม)



มาร์คูไบ



ยาเกษตร ตราเจ็ท



เสือ
การเกษตร
Tiger Agriculture Since 2000

© Thirasak Chuchoet



การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช



ใช้งานผิดประเภท



ถูกต้อง-เหมาะสม

