

ธาตุอาหารพืช

(Plant nutrient)





ใกล้ 4 แยกห้วยถนน (เซ็นทรัลเมืองคอน)


นครศรีธรรมราช



“จินตนาการ” สำคัญกว่า “ความรู้”

“Imagination”
is more important than
“Knowledge”

Albert Einstein
(1879-1955 ; aged 76)



สารอาหาร (หลัก) ในสิ่งมีชีวิต

พืช

คาร์โบไฮเดรต
อะมิโน-โปรตีน
ลิพิด-ไขมัน
กรดนิวคลีอิก
วิตามิน
เกลือแร่/แร่ธาตุ

คนและสัตว์

คาร์โบไฮเดรต
อะมิโน-โปรตีน
ลิพิด-ไขมัน
กรดนิวคลีอิก
วิตามิน
เกลือแร่/แร่ธาตุ



แหล่งที่มาของสารอาหารในสิ่งมีชีวิต

สารอินทรีย์	คน และสัตว์	พืช
คาร์โบไฮเดรต	กิน (พืช และเนื้อ)	การสังเคราะห์ด้วยแสง (PS)
อะมิโน-โปรตีน	กิน (พืช และเนื้อ)	สังเคราะห์จากสารอินทรีย์ (CHO) + ปุ๋ย
ลิพิด-ไขมัน	กิน (พืช และเนื้อ)	สังเคราะห์จากสารอินทรีย์ (CHO)
กรดนิวคลีอิก	กิน และกรดนิวคลีอิก	สังเคราะห์จากสารอินทรีย์ (CHO) + ปุ๋ย
วิตามิน	กิน (พืช เนื้อ อาหารเสริม)	สังเคราะห์จากสารอินทรีย์ (CHO) + ปุ๋ย
เกลือแร่ /แร่ธาตุ	กิน (พืช เนื้อ อาหารเสริม แร่)	ดูดปุ๋ยในรูปสารละลายไอออน (Ion solute) ผ่านทางรากและใบ





MARBURY

มาร์คูโบ

ระบบท่อลำเลียงของพืช (Vascular system)



เปลือกไม้ (Cork)


เนื้อเยื่อเจริญ
(Vascular system)

วงปี (Annual ring)

แก่นไม้ (Heartwood)

ไส้ไม้ (Pith)


เนื้อเยื่อเจริญ
(Vascular system)



มาร์คูโบ

อะไร.. ยังไง.. ในต้นพืช





ท่อลำเลียงน้ำ
(Xylem)

ท่อลำเลียงอาหาร
(Phloem)

ใบแก่ (ผู้ผลิต : Source)

- Glu = น้ำตาลกลูโคส
- Suc = น้ำตาลซูโครส
- AA = กรดอะมิโน
- K⁺ = โพแทสเซียม

3 แรงดันน้ำในใบพืช: -4 ถึง -15 บาร์

2 แรงดันน้ำในราก: -2 บาร์

* น้ำแพร่เข้าสู่รากเกิดจากความต่างศักย์ของค่า water potential (WP) ของน้ำ ปกติน้ำในดินจะมีค่า WP สูงกว่าภายในพืช


1 แรงดันน้ำในดิน: -0.05 บาร์

ผู้ใช้สารอาหาร (Sink)
ผู้ใช้ลำดับที่ 1: ใบอ่อน + ผลแก่
ผู้ใช้ลำดับที่ 2: ดอก + ผลอ่อน
ผู้ใช้ลำดับที่ 3 : ราก + ใบไม้โตนแดง และใบเสื่อมสภาพ

← วิถีซิมพลาสต์
← วิถีอะโพพลาสต์

ขนราก

ช่อง: พลาสโมเดสมาตา



ท่อลำเลียงน้ำ
(Xylem)

ท่อลำเลียงอาหาร
(Phloem)

K^+ K^+ K^+
 K^+ K^+ **2**

1

3

4

5

แคมเบียมเซลล์
แหล่งสะสมอาหาร

6

N-P-Mg-S

*ใช้ปุ๋ยใหม่ 20% (N), อาหารสะสม 80%

Legaz et al. (1982) และ Dasberg (1983, 1987)

ใบแก่ (ผู้ผลิต : Source)

Glu = น้ำตาลกลูโคส

Suc = น้ำตาลซูโครส

AA = กรดอะมิโน

K^+ = โพแทสเซียม

ผู้ใช้สารอาหาร (Sink)

ผู้ใช้ลำดับที่ 1: ใบอ่อน + ผลแก่

ผู้ใช้ลำดับที่ 2: ดอก + ผลอ่อน

ผู้ใช้ลำดับที่ 3 : ราก + ใบไม้โดนแสง

และใบเสื่อมสภาพ

**ในบางพืช/ไม้ผลบางพันธุ์*

*ผู้ผลิต (Source) ไม่สามารถรองรับผู้ใช้
ได้มากกว่า 1 ผู้ใช้*



— “กิ่งโคร-รากมัน” และ “รากเดิน-ยอดงยับ” —

1


ระบบท่อลำเลียง
“กิ่งโคร-รากมัน”

2

สมดุลอาหาร
“รากเดิน-ยอดงยับ”

3

การนำไปใช้
“ไนเตรท-ออกซิน”



① ท่อลำเลียงทอดยาวตามแนวจาก
“ส่วนใต้ดิน สู่ ส่วนเหนือดิน”
(Sectoriality)

1
ระบบท่อลำเลียง
“กิ่งโคร-รากมัน”

ท่อหรือช่องทางแหว่งแนวท่อลำเลียง
② “รักษาสมดุลทั่วต้น”
(Integration)

จุดสังเกต : 1. ใบไหม้ หรือใบร่วงฝั่งไหน ฝั่งนั้นแตกยอดใหม่
2. ฝั่งไหนไม่มีกิ่ง-มียอด ฝั่งนั้นรากน้อย รากไม่พัฒนา
3. แฉ่งกิ่ง 2 ฝั่งไม่พร้อมกัน แตกยอดไม่พร้อมกัน



สมดุลระหว่างผู้ใช้สารอาหาร กับ ผู้ผลิต “Source - Sink interrelationship”

“รากเดิน - ยอดขยับ” จะสร้างยอดใหม่
หน่วยสนับสนุนเสบียง (ราก) ต้องส่งกำลังบำรุงได้เพียงพอ



ส่วนเหนือดิน

มาร์คใบ

ยอด

ออกซิน (Auxin)

2

การส่งสัญญาณระยะไกล
"Signaling Linkage"

สมดุลอาหาร
"รากเดิน-ยอดงยับ"

เคลื่อนย้ายสู่ส่วนล่าง - ช่มตาข้าง
รากพัฒนา - รากแผ่ขยายออก

"feedback loop"

โมเลกุลสัญญาณ (ขนส่งผ่านท่อน้ำ)
เจริญทางยอด - กระตุ้นแบ่งเซลล์

ความสัมพันธ์ระหว่าง ออกซิน กับ โซโตโคนิน
Skoog and Miller (ไม้ทราบปี)

พลังงาน +
โปรตีนขนส่ง (ออกจากราก)

ปลายราก

กระตุ้น

ตอบสนองต่อ "ไนโตรเจน" โดยเฉพาะในรูป ไนเตรต
รากสังเคราะห์โซโตโคนินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โซโตโคนิน (Cytokinin)



ส่วนใต้ดิน



ส่วนเหนือดิน

มาร์ค

ออกซิน (Auxin)

ตัดแต่งกิ่ง ยอด ใบไหม้-หลุดร่วง



ลดลง

ข่มตาข้างลดลง



ปลายราก

คงเดิม

สัดส่วน “ราก ต่อ ยอด”
“Root/Shoot Ratio”

สมดุลอาหาร
“รากเดิน-ยอดงยับ”

2

ไซโตไคนิน กระตุ้นตาเจริญ

ไซโตไคนิน > ออกซิน

ปริมาณเท่าเดิม


ไซโตไคนิน (Cytokinin)



ส่วนใต้ดิน

1. กระตุ้นรากใหม่ “ปุ๋ยไนโตรเจน, แบล็กเอิร์ธ, ออกซิน”
 2. การตัดแต่งกิ่ง (สัดส่วน ราก ต่อ ยอด) ก่อนตั้งยอด/ดอก 30วัน
 3. การให้น้ำ/ดินมีความชื้นสม่ำเสมอ ส่งเสริมการทำงานของรากเป็นปกติ
- การให้น้ำเปียก สลับ แห้ง เป็นการกระตุ้นให้รากเจริญแผ่ขยาย

มีโครงสร้างที่ออกฤทธิ์
คล้าย “ออกซิน”



มี “ไนโตรเจน”



ออกซิน



แบล็กเอิร์ธ



MARKET

มาร์คูป

M

A

R

D

ตัดยอดกระโดน และตัดแต่งกิ่ง

สารออกซิน/สารมีฤทธิ์ออกซิน เช่น

- 1) IAA (Indole-3-acetic acid)
- 2) NAA (1-naphtyl acetic acid)
- 3) IBA (4-indol-3-yl butyric acid)

ยาฆ่าหญ้า เช่น 2,4-D และ 4-CPA

ตัดยอดกระโดน ต้องทา/ป้าย “ออกซิน” ด้วยความเข้มข้น 45,000-50,000 ppm. (มก./ลิตร)

ออกซิน = ฮอร์โมน

1. IAA (พืชสร้างเอง)
2. NAA (4.5%)
3. IBA (เคยมีขาย)



ภาพเปรียบเทียบ
ต่อข้างแทนยอดกระโดน

อธิบายในหน้าถัดไป

ออกซิน มีสมบัติ “Apical dominance” คือ การข่มของส่วนยอด หรือการข่มตาข้าง

ตัดยอดกระโดน
และตัดแต่งกิ่ง



ไอเอเอ (IAA)



กิ่งกระโดนใหม่



ตัดยอดกระโดน
และตัดแต่งกิ่ง



ตัวอย่าง : ออกซิน



“ปัจจัยการออกดอกไม้ผล”

การจัดการทรงพุ่ม
(Pruning)



ความเข้มแสง
(Light intensity)



สภาพอากาศ
(Climate)

การเจริญเติบโต

└ Vegetative growth (V) และ
└ Reproductive growth (R)



“สัดส่วน C/N (C/N Ratio)”

ไนโตรเจน (N) และ
คาร์โบไฮเดรต (CHO)
└ ฟังก์ชันเซลล์/โครงสร้าง



การเจริญทางลำต้น-ใบ
(Vegetative growth)

คาร์โบไฮเดรต (CHO)

คาร์โบไฮเดรต (CHO)
└ แป้ง (Starch)
└ น้ำตาล (Sugar)

การออกดอก
(Reproductive growth)




- การออกดอกของไม้ผล (Flowering hypothesis)
ลด “ไนโตรเจน: N” เพิ่ม “คาร์โบไฮเดรต: C”
= ออกดอก





“สัดส่วน C/N (C/N Ratio)”



“สัดส่วน C/N (C/N Ratio)”

การศึกษาเรื่อง สัดส่วน C/N
 Kraus & Kraybill, 1918 (OS University)

ไม้พุ่มเตี้ยร้อน
 สัดส่วน C/N : ~~20/12, 20/8, 20/4, 20/2~~

- 1 สัดส่วน : C..? / N สูงมาก
 - ขี้ใบ, ใบดำ, พุ่มแน่นทึบ
- 2 สัดส่วน : C สูง / N สูง
 - ไม่ถึงกับขี้ใบ, พุ่มแน่นทึบ, ออกดอกได้
- 3 สัดส่วน : C สูง / N ต่ำ
 - พุ่มไม่แน่นทึบ, ใบเขียวปกติ, ตัดแต่งกิ่ง/ใบ
 - ออกดอก
- 4 สัดส่วน : C..? / N ขาด
 - ต้นทรุดโทรม, ต้นกระแจะ




“สัดส่วน C/N (C/N Ratio)”

การออกดอกของไม้ผล
(Flowering hypothesis)



แพคโคฯ ยับยั้งการเคราะห์จิบเบอเรลลิน



PBZ ยับยั้งเอนไซม์ **Cytochrome P450 monooxygenase**
“KO (ent-kaurene oxidase), KAO (ent-kaurenoic acid oxidase), C14-demethylase”

“ออกซิน” สังกะหร่ที่ปลายยอดเจริญ
ยอดอ่อน ใบอ่อน เมล็ด และตาเจริญ

ฮอร์โมนกับการเกิดดอก (ไม้ผล)

ราว 30-60 วัน / น้อยกว่านี้



อากาศแล้ง 7-10 วัน

แพคโคลบิวทราโซล
(สารชะลอการเจริญเติบโต)

“จิบเบอเรลลิน” ส่วนใหญ่สังเคราะห์จาก
ยอดอ่อน ปลายราก เมล็ดที่กำลังงอก
พบน้อยในใบแก่ ดอก และผลอ่อน

ระยะเกิดดอก

ระดับฮอร์โมน

“จิบเบอเรลลิน” ลดลง

ระดับฮอร์โมน

“เอทิลีน” เพิ่มสูงขึ้น

เอทิลีน

ควันไฟ

กักน้ำ/ขาดน้ำ
หรือน้ำท่วม

กระตุ้นการสังเคราะห์ “เอทิลีน”

ฮอร์โมน “ไซโตไคนิน” ส่วนใหญ่สังเคราะห์จากราก

สาร “แพกโคลบิวทราซอล”

อัตราใช้สาร “แพกโคลฯ” ในทุเรียน

พ่นครั้งที่ 1: ความเข้มข้น 1,000-1,500 มก./ลิตร

พ่นครั้งที่ 2: ห่างจากครั้งแรก 7-10 วัน และลดอัตราลงครึ่งหนึ่ง

**หมายเหตุ: กรณีทำสารนอกฤดูและมีฝน*



แพกโคล 10%
2.0-3.0 กก.

หรือ



แพกโคล 15%
1.3-2.0 กก.

หรือ



แพกโคล 25%
800-1,200 ซีซี.

อัตราที่ความเข้มข้น
1,000-1,500 มก./ลิตร



แพกโคลบิวทราโซล 25%

อัตรา : 800-1,200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

ตัวอย่าง : คำนวณความเข้มข้น 1,000
มก./ลิตร (ppm)
ผสมในน้ำ 200 ลิตร

1 แปลงหน่วยน้ำที่ใช้ จาก “ลิตร” เป็น “ppm”

$$(200 \text{ ลิตร}) \times (1,000 \text{ ซีซี.}) = 200,000 \text{ ซีซี.}$$

2 แปลงหน่วยเปอร์เซ็นต์จากแพกโคล 25% เป็น “ppm”

$$([25] / [100]) \times (1,000,000) = 250,000$$

3 คำนวณแพกโคล 25% ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 ppm

$$([200,000] \times [1,000 \text{ ppm}]) / (1,000,000) = 800 \text{ ซีซี.}$$

ดังนั้น ความเข้มข้น 1,000 ppm เท่ากับ แพกโคล 25% 800 ซีซี./น้ำ 200 ลิตร





แพคโคลบิวทราโซล 25%

อัตรา : 1.5 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อ ϕ ทรงพุ่ม 1 ม.

ตัวอย่าง : คำนวณปริมาณแพคโคล 25%
ทุเรียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทรงพุ่ม 8 เมตร

ข้อมูลที่ต้องทราบ :

- 1 อัตรา 1.5 กรัมสารออกฤทธิ์ อ้างอิงข้อมูลจาก
อัตรามาตรฐานของมะม่วงพันธุ์หูก
นก
- 2 สารออกฤทธิ์ (Active ingredient ; a.i) คือ
สารออกฤทธิ์หลักในผลิตภัณฑ์ เช่น ลิงบุ 25
ขนาด 1,000 ซีซี. จะมีสารออกฤทธิ์แพคโคลฯ
เท่ากับ 250 กรัม




แพคโคลบิวทราโซล 25%


อัตรา : 1.5 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อ ϕ ทรงพุ่ม 1 ม.

ตัวอย่าง : คำนวณปริมาณแพคโคล 25%
ทุเรียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทรงพุ่ม 8 เมตร

- 1 คำนวณปริมาณสารออกฤทธิ์ (a.i.) ต่อขนาดทรงพุ่ม
 $(1.5 \text{ กรัม}) \times (8 \text{ เมตร}) = 12 \text{ กรัม}$ ของสารออกฤทธิ์
- 2 คำนวณแพคโคล 25% จากปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ได้
 $([100] / [25]) \times (12 \text{ กรัม}) = 48 \text{ ซีซี.}$ ของแพคโคล 25%
- 3 กรณี พ่นทั้งหมด 100 ต้น และใช้น้ำพ่น 12 ลิตร/ต้น
 $(48 \text{ กรัม}) \times (100 \text{ ต้น}) = 4,800 \text{ ซีซี.}$
= แพคโคล 25% 4,800 ซีซี./น้ำ 1,000 ลิตร, กรณีพ่นซ้ำให้ลดอัตราลงครึ่งหนึ่ง

ธาตุอาหารพืช และปัจจัยการเจริญเติบโต





The diagram illustrates a repeating unit of cellulose, a polysaccharide. It consists of two glucose molecules, each represented as a six-membered ring in a chair conformation. The rings are connected by a β -1,4-glycosidic bond, where the oxygen atom of the bond is positioned between the C1 of the left glucose and the C4 of the right glucose. Both glucose units have a hydroxyl group (OH) at C2 and a hydroxymethyl group (CH_2OH) at C5. The entire unit is enclosed in large square brackets with a subscript n , indicating it is a repeating polymer unit.

อัลฟา-คาร์บอน

The diagram shows a central alpha-carbon atom (grey sphere) bonded to four groups: an amino group (NH₂, blue spheres) on the left, a hydrogen atom (blue sphere) above, an R group (white sphere) below, and a carboxyl group (COOH, red and blue spheres) on the right. The background is divided into three colored vertical bands: yellow for the amino group, orange for the alpha-carbon, and green for the carboxyl group.

หมู่เอมีโน **R** **หมู่คาร์บอกซิล**

—NH₂ **—COOH**




ความเข้มข้นของธาตุ/สารในท่อลำเลียงน้ำและอาหาร (Xylem & Phloem) ของพืชชั้นสูง

ปรับปรุงจาก: Epstein และ Bloom (2005), ยงยุทธ (2558)

สาร & ธาตุอาหาร	ความเข้มข้น (มก./ล. หรือ ppm)		รูปของสารและธาตุอาหาร
	ท่อน้ำ (Xylem)	ท่ออาหาร (Phloem)	
1. น้ำตาล (Sugar)	ไม่พบ	140,000-210,000	$C_{12}H_{22}O_{11}$
2. ไนโตรเจน (N)			* ยูเรีย = $CO(NH_2)_2$
2.1 กรดอะมิโน	200-100	900-10,000	$H_2N-C-COOH$ และ $-R$
2.2 ไนเตรท	1,500-2,000	ไม่พบ	NO_3^-
2.3 แอมโมเนียม	7-60	45-846	NH_4^+
3. ฟอสฟอรัส (P)	70-80	300-350	$H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-} (บนฉลาก P_2O_5)
4. โพแทสเซียม (K)	200-800	2,800-4,400	K^+ (บนฉลาก K_2O)
5. แคลเซียม (Ca)	150-200	80-150	Ca^{2+} (ฉลาก Ca (ใหม่), CaO (เก่า))



ความเข้มข้นของธาตุ/สารในท่อลำเลียงน้ำและอาหาร (Xylem & Phloem) ของพืชชั้นสูง

ปรับปรุงจาก: Epstein และ Bloom (2005), ยงยุทธ (2558)

สาร & ธาตุอาหาร	ความเข้มข้น (มก./ล. หรือ ppm)		รูปของสารและธาตุอาหาร
	ท่อน้ำ (Xylem)	ท่ออาหาร (Phloem)	
6. แมกนีเซียม (Mg)	30-200	100-400	Mg^{2+} (บนฉลาก Mg (ใหม่), MgO (เก่า))
7. แมงกานีส (Mn)	0.2-0.4	0.9-3.4	Mn^{2+}
8. สังกะสี /ซิงค์ (Zn)	1.5-7.0	8-23	Zn^{2+}
9. ทองแดง /คอปเปอร์ (Cu)	0.1-2.5	1-5	Cu^{2+}
10. โบรอน (B)	3-6	9-11	$B(OH)_3$, BO_3^{3-}

BO_3^{3-} ; ออร์โบอเรต เช่น ไตรโซเดียมออร์โบอเรต



รูปที่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช


ธาตุอาหาร	สัญลักษณ์	รูปเป็นประโยชน์	ธาตุอาหาร	สัญลักษณ์	รูปเป็นประโยชน์
คาร์บอน (Carbon)	C (45%)	CO_2	คลอรีน (Chlorine)	Cl (100 มก.)	Cl^-
ไฮโดรเจน (Hydrogen)	H (5-6%)	H_2O	ทองแดง (Copper)	Cu (6-25, 125 มก.)	Cu^{2+}
ออกซิเจน (Oxygen)	O (45%)	$\text{O}_2, \text{H}_2\text{O}$	โบรอน (Boron)	B (5-20, 50 มก.)	$\text{B(OH)}_3, \text{BO}_3^{3-}$
ไนโตรเจน (Nitrogen)	N (1.5-2.2%)	NO_3^- , NH_4^+ , Urea	เหล็ก (Iron)	Fe (100-250 มก.)	$\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)	P (0.2-0.4%)	H_2PO_4^- , HPO_4^{2-}	โมลิบดีนัม (Molybdenum)	Mo (0.1 มก.)	MoO_3^{2-}
โพแทสเซียม (Potassium)	K (1-2.5%)	K^+	แมงกานีส (Manganese)	Mn (50-300 มก.)	Mn^{2+}
แคลเซียม (Calcium)	Ca (0.5-2.3%)	Ca^{2+}	สังกะสี (Zinc)	Zn (20-100 มก.)	Zn^{2+}
แมกนีเซียม (Magnesium)	Mg (0.2-0.4%)	Mg^{2+}	นิกเกิล (Nickle)	Ni (0.05 มก.)	Ni^{2+}
กำมะถัน (Sulfur)	S (0.1-0.5%)	SO_4^{2-}	*** ยูเรีย = $\text{CO(NH}_2)_2$ และไนโตรเจนในรูปกรดจะมีใบพืชดูใช้ได้ ***		

กฎต่ำสุดของลืบิก

(Liebig's Law of the minimum)




Mulder' chart



ปรับปรุงจาก: D. Mulder

ปัจจัยที่ได้รับน้อยที่สุด เป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต
น้ำในถังไม้ คือ “ผลผลิต” ซี่ไม้ คือ “ปัจจัย-ธาตุ”
ตัวอย่าง ธาตุเหล็กได้รับต่ำสุดและไม่เพียงพอ ผลผลิตจะได้ต่ำความสูง
ของธาตุเหล็ก แม้เพิ่มปัจจัยอื่นสักเท่าไร

อิทธิพลความเป็นกรด-ด่างต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช



ปุ๋ยฟอสเฟต เช่น 0-46-0
(ทริบิลฟอสเฟต) หรือ 18-
46-0 (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)
เมื่อใส่ลงดินและละลายน้ำ แรก
ตัวได้

H_2PO_4^- และ HPO_4^{2-}
ตามลำดับ เมื่อรวมกับแคลเซียม
คาร์บอเนต จะกลายเป็น ไตร
แคลเซียมฟอสเฟต ละลายน้ำได้
น้อย




การดูปุ๋ยของราก (รากขน) เป็นการแลกเปลี่ยนประจุ (+/-)

ปุ๋ยไนเตรต (NO_3^-)



ประจุลบ



ปุ๋ยแอมโมเนียม (NH_4^+)




ประจุบวก




ปุ๋ยเคมีทำให้ดินเป็นกรด
จริงหรือ..?

© Thirasak Chuchot



ขนาดของช่องโปรตีน เซลล์พืช และการดูดธาตุอาหาร







= ราคาต่าง, น้ำาแพร่เข้าสู่ต้น




) = รากเหี่ยวเฉา-ตาย



การแพร่ของสารเข้าสู่เซลล์ (Simple diffusion)




การแพร่ผ่านช่องโปรตีน (Facilitated diffusion)




การขนส่งธาตุ / สารอาหารผ่านเยื่อหุ้ม (หลักการเดิม)

ขนส่งแบบไม่ใช้พลังงาน (Passive transport)




ขนส่งแบบใช้พลังงาน (Active transport)




การขนส่งธาตุ / สารอาหารผ่านเยื่อหุ้ม (หลักการใหม่)

ขนส่งแบบใช้พลังงานปฐมภูมิ (Primary active transport)



ขนส่งแบบใช้พลังงานทุติยภูมิ (Secondary active transport)



บทบาทของธาตุอาหารพืช (อย่างย่อ)

ปรับปรุงจาก: Epstein และ Bloom (2005), ยงยุทธ (2558)

มีหน้าที่เฉพาะ	มีหน้าที่เดียว	มีหลายหน้าที่	อื่นๆ
1. อยู่ในโครงสร้างสารประกอบอินทรีย์ (CHO)	N, S	-	-
2. เกี่ยวข้องกับสารให้พลังงานและเชื่อมสาย DNA	P	-	-
3. อยู่ในโครงสร้างผนังเซลล์	B	Ca	Si
4. โครงสร้างของเอนไซม์และสารอินทรีย์ของเมตาบอลิซึม	Ni, Mo	Mg, Fe, Mn, Zn, Cu	-
5. กระตุ้นเอนไซม์	Mg, Ca, Mn, Fe, Zn, Cu	K, Cl	Na
มีหน้าที่ไม่เฉพาะ	สัญลักษณ์ธาตุ/ไอออน		
1. รักษาสมดุลประจุภายในเซลล์	K, Na, NO ₃ ⁻ , Cl, SO ₄ ²⁻ , Ca, Mg		
2. ปรับศักยภาพออสโมซิส	K, Na, NO ₃ ⁻ , Cl		



บทบาทของธาตุอาหารพืช (ย่ออย่างสั้น)

ปรับปรุงจาก: ยงยุทธ (2558)

พืช (เซลล์พืช / เนื้อเยื่อ)

ดูดปุ๋ยในรูปของไอออน

หรือโมเลกุลขนาดเล็ก

รวมร่างกับ CHO เป็นโครงสร้าง
(Structure function)


โคแฟกเตอร์ (ช่วยงานเอนไซม์)
(Catalytic function)

*** กรดฮิวมิก และกรดฟูลวิก รากพืชสามารถดูดใช้ได้



ช่วงความยาวคลื่นแสง 380-760 นาโนเมตร



บาร์คูโบ



สังเคราะห์แสง
(Photosynthesis)


แรงดันน้ำในใบพืช: -4 ถึง -15 บาร์

> 92%



กลูโคส ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

+



น้ำ 6 โมเลกุล

+



ก๊าซออกซิเจน
6 โมเลกุล

การแพร่


แรงดันน้ำในดิน: -0.05 บาร์

โมเลกุลน้ำ (H_2O)

แรงดันน้ำในราก: -2 บาร์

คลอโรพลาสต์ เหมือนโรงงานผลิตน้ำตาล และได้ก๊าซออกซิเจน (O_2) เป็นผลพลอยได้
ภายในคลอโรพลาสต์บรรจุไปด้วยรงควัตถุ เช่น คลอโรฟิลล์ แคโรทีนอยด์ ใช้เก็บเกี่ยวคลื่นแสงช่วง 380-700 นาโนเมตร และเปลี่ยนเป็นพลังงานชีวเคมีเพื่อสังเคราะห์น้ำตาล การสังเคราะห์น้ำตาล เกิดขึ้นที่สโตรมา ซึ่งเป็นของเหลวภายในคลอโรพลาสต์

การสังเคราะห์แสง Vs การหายใจ (ระดับเซลล์)




อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งหมด และอัตราการหายใจ (Gross photosynthesis rate and respiration rate)

ช่วงความยาวคลื่นแสง 380-760 นาโนเมตร



อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและอัตราการหายใจของพืช




1 พืชดำรงชีวิตไม่ได้

2 การเจริญเติบโตปกติ

3 ไม่มีการเจริญเติบโต

4 พืชดำรงชีวิตไม่ได้



กลูโคส (C₆H₁₂O₆)


— อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งหมด

— การสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิ





— อัตราการหายใจ



ปุ๋ยยูเรีย.. เปิดปากใบพืช.?



ช่วงแสง 400-500 นาโนเมตร



ปริมาณการดูดซับปุ๋ยยูเรีย Vs กรดอะมิโน

ตารางที่ 5.2

ปริมาณไนโตรเจนที่มีในดินและที่ใบที่ดูดได้หลังการให้ปุ๋ย 70 วัน (ค่าเฉลี่ย $\pm$ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)

ปุ๋ย	N (มก/ต้น)	จำนวนใบ/ต้น	N (มก/ใบ)	สัดส่วนที่ดูด (%)
ยูเรีย	83.9 $\pm$ 12.0	403 $\pm$ 137	0.224 $\pm$ 0.046	87.7 $\pm$ 11.9
NaNO ₃	66.5 $\pm$ 19.6	452 $\pm$ 50	0.144 $\pm$ 0.028	76.4 $\pm$ 7.5
NH ₄ Cl	38.4 $\pm$ 0.6	377 $\pm$ 60	0.104 $\pm$ 0.015	59.8 $\pm$ 4.5
อะลานีน	29.9 $\pm$ 1.1	532 $\pm$ 57	0.055 $\pm$ 0.018	14.2 $\pm$ 1.1
กรดกลูตามิก	12.8 $\pm$ 2.2	334 $\pm$ 43	0.040 $\pm$ 0.013	10.0 $\pm$ 4.0
ไกลซีน	25.9 $\pm$ 5.8	446 $\pm$ 123	0.059 $\pm$ 0.003	25.3 $\pm$ 6.2
ไลซีน	36.8 $\pm$.2	355 $\pm$ 102	0.104 $\pm$ 0.036	25.8 $\pm$ 2.8

ที่มา : Furuya และ Umemiya (2002)




คลอโรพลาสต์ โรงงานไฟฟ้าของพืช

เนื้อเยื่อพืช

เซลล์พืช

คลอโรพลาสต์



คลอโรพลาสต์ โรงงานไฟฟ้าของพืช

เยื่อหุ้ม (Membrane)

ชั้นนอก (outer)

ชั้นใน (inner)

ของเหลว (สีเหลือง)
“สโตรมา (Stroma)”

ไรโบโซม (Ribosome)

กรานุม
(Granum)

สโตรมา ลามลลา
(Stroma Lamella)


ไทลาคอยด์ (Thylakoid)

เยื่อหุ้มไทลาคอยด์
(Thylakoid membrane)

ลูเมน (Lumen)



“คลอโรฟิลล์” เป็นเม็ดสีเขียวที่ทำหน้าที่เป็นโซล่าเซลล์



ส่วนหัว (Porphyrin ring)
แมกนีเซียม 1 ตัว (อะตอม)
ไนโตรเจน 4 ตัว (อะตอม)

ส่วนหาง (Phytol tail)

Jynto (talk), 31 July 2011. [wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll-a-3D-balls.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll-a-3D-balls.png)





มาร์คูไบ

ธาตุอาหารที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง

ไรโบโซม
(Ribosome)

- [DNA, RNA]
- ไนโตรเจน (N)
- ฟอสฟอรัส (P_i)

สโตรมา
(Ribosome)

- [เอนไซม์, ATP, NADPH]
- ไนโตรเจน (N)
- ฟอสฟอรัส (P_i)
- กำมะถัน (S)

*เอนไซม์ที่สำคัญ เช่น รูบิสโค (RuBisCO)


เยื่อหุ้มเซลล์
(Membrane)

- [ลิพิด - โปรตีน]
- ไนโตรเจน (N)
- ฟอสฟอรัส (P_i)
- แคลเซียม (Ca)
- โบรอน (B)
- น้ำตาล (Sugar)


ไทลาคอยด์ (Thylakoid)



ธาตุอาหารที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง



ธาตุอาหารที่ไม่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง



ปริมาณธาตุอาหารที่พบในใบทุเรียน เมื่ออายุเพิ่มขึ้น

อายุใบ	มหธาตุ (%)			Ca	Mg	จุลธาตุ (ppm)				
	N	P	K			Fe	Mn	Cu	Zn	B
3 เดือน	2.25d	.22b	2.09d	1.41a	.41abc	79.6a	71.5a	29.7a	19.3a	40.5a
4 เดือน	2.19c	.23b	2.32c	1.67b	.44c	85.6a	89.7b	37.9a	27.9a	45.1b
5 เดือน	2.22cd	.23b	2.18d	1.89c	.43c	78.2a	92.4bc	90.3a	33.7bcd	53.0d
6 เดือน	2.19c	.22b	1.97c	2.22d	.42bc	107.6b	103cd	124c	35.8cd	45.1b
7 เดือน	2.09b	.23b	1.78b	2.12d	.37a	133.3c	108de	117c	32.0ab	48.9c
8 เดือน	2.06b	.23b	1.73ab	2.23d	.38ab	164.8d	110de	102bc	33.0ab	45.2b
9 เดือน	1.95a	.19a	1.63a	2.63e	.37a	200.0e	117e	113bc	40.1d	43.1ab
10เดือน	1.92a	.19a	1.69a	2.94f	.38ab	196.6e	109de	112bc	37.5cd	-

ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี


Duncan's multiple range test

ปรับปรุงจาก: สุมิตา, 2544






ความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบทุเรียนอายุต่างๆ (หน่วย : เปอร์เซ็นต์)



ความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบทุเรียนอายุต่างๆ (หน่วย : ppm)



ธาตุอาหารพืช (ปุ๋ย) และธาตุเสริมประโยชน์

มหาธาตุ (Macronutrient) : ปริมาณในพืช > 500 มก./กก. นน.แห้ง

- ▶ ธาตุหลัก (Primary nutrient element) ;
ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)
- ▶ ธาตุรอง (Secondary nutrient element) ;
แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S)

จุลธาตุ (Micronutrient) : ปริมาณในพืช < 100 มก./กก. นน.แห้ง

เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn), สังกะสี (Zn), ทองแดง (Cu),
โบรอน (B), โมลิบดีนัม (Mo), คลอรีน (Cl) และนิเกิล (Ni)



ธาตุอาหารพืช (ปุ๋ย) และธาตุเสริมประโยชน์

ธาตุเสริมประโยชน์ (Beneficial element) :

- ▶ ไม่ใช่ธาตุอาหารพืช แต่ช่วยเรื่องการเจริญเติบโต
- ▶ เป็นธาตุอาหารของบางพืช แต่ไม่ใช่ของทุกพืช

โซเดียม (Na), ซิลิคอน (Si), โคบอลต์ (Co), ซีลีเนียม (Se),
อะลูมิเนียม (Al), วานาเดียม (V) และไทเทเนียม (Ti)



ปริมาณธาตุอาหารที่ตรวจพบในทุเรียน (นน.แห้ง)

Table 30. Comparison of durian leaf nutrient levels.

Durian Leaf Analysis		N %	P %	K %	S %	Ca %	Mg %	Na %	Cl %	Mn mg/kg	Fe mg/kg	Cu mg/kg	Zn mg/kg	B mg/kg
Durian (Project samples) 23 samples March 2000 to March 2001	Av.	1.95	0.24	1.53	0.24	1.59	0.70	0.04	0.02	69.52	57.35	8.06	11.95	58.96
	St dev	0.23	0.05	0.40	0.05	0.37	0.09	0.01	0.01	30.18	18.45	1.71	2.57	18.65
Malaysian Recommended Range (leaf age 4 - 6 months)	min	1.80	0.12	1.60	0.16	0.90	0.25	na	na	25.00	50.00	6.00	15.00	15.00
	max	2.30	0.25	2.20	0.25	1.80	0.50	na	na	50.00	150.0	10.00	40.00	80.00
NT Standards (TK Lim)	min	1.58	0.18	1.48	0.17	1.11	0.25	0.01	0.05	6.25	15.02	5.82	11.92	33.29
	max	1.98	0.22	1.96	0.22	1.88	0.50	0.09	0.07	27.65	30.86	12.47	14.64	38.52
สุมิตา, 2545	ต่ำ	2.0	0.15	1.7	-	1.5	0.35	-	-	40	50	10	10	35
	สูง	2.3	0.25	2.5	-	2.5	0.6	-	-	100	120	25	30	60

ที่มา: G. Zappala, A. Zappala and Y. Diczbalis, 2002 และสุมิตา, 2545



ปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่างๆ ของทุเรียน

ปริมาณธาตุอาหารหลัก ในส่วนต่างๆ ของทุเรียน (น.น.แห้ง)

	% N	% P	% P ₂ O ₅	% K	% K ₂ O
เนื้อทุเรียน	1.12	0.11	0.25	1.43	1.72
เปลือก ทุเรียน	0.61	0.17	0.39	1.59	1.91
เมล็ดทุเรียน	1.20	0.24	0.55	1.28	1.54
ใบทุเรียน	2.0-2.4	0.15-0.25	0.35-0.58	1.5-2.5	1.8-3.0



ที่มาและปรับปรุงจาก : ปรับปรุงจาก สุมิตา

ปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่างๆ ของทุเรียน

ปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลทุเรียน (1,000 กก. น้ำหนักสด)

กิโลกรัม				
ธาตุอาหาร	% N	% P ₂ O ₅	% K ₂ O	ที่มา และปรับปรุงจาก
มาเลเซีย	2.40	0.92	5.00	Ng and Thamboo, 1967
ออสเตรเลีย	2.00	0.92	5.30	Diczbalis & Westerhuis, 2005
ไทย	2.30	-	5.50	วนิดา, 2546
ไทย	1.90	0.80	3.80	นารี (ยังไม่ตีพิมพ์)
ค่าเฉลี่ย	2.15	0.88	4.90	
สัดส่วนปุ๋ย	2	1	5	

ที่มาและปรับปรุงจาก : ปรับปรุงจาก สุมิตา





มหาธาตุ (macronutrient)

ธาตุหลัก

N ไนโตรเจน	P ฟอสฟอรัส	K โพแทสเซียม
----------------------	----------------------	------------------------

ธาตุรอง

S กำมะถัน	Ca แคลเซียม	Mg แมกนีเซียม
---------------------	-----------------------	-------------------------

จุลธาตุ หรือธาตุเสริม (micronutrient)

Fe เหล็ก	Zn สังกะสี	Mn แมงกานีส	Cu ทองแดง
--------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

B โบรอน	Mo โมลิบดีนัม	Cl คลอรีน	Ni นิกเกิล
-------------------	-------------------------	---------------------	----------------------

* คาร์บอน, ไฮโดรเจน และออกซิเจน ได้จากน้ำ อากาศ และดิน



ผลวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นธาตุอาหารพืชในเนื้อเยื่อ (ทำให้แห้ง) นำมาใช้เป็นคำแนะนำการใช้ปุ๋ย

ตัวอย่างสัดส่วนปุ๋ย N-P-K

สัดส่วนปุ๋ย 3-1-4 เช่น ปุ๋ยสูตร 15-5-20

สัดส่วนปุ๋ย 3-1-5 เช่น ปุ๋ยสูตร 15-5-25



สัดส่วนปุ๋ย N ต่อ P ต่อ K

มาจากค่าผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่พบในเนื้อเยื่อพืช

เฉลี่ยปริมาณธาตุอาหารในทุเรียน

N: ~ 2.0%
P₂O₅: ~ 0.47%
K₂O: ~ 2.4%

↓

(N / P₂O₅): 2.0/0.47
= 4.25

(K / P₂O₅): 2.4/0.47
= 5.10

↓



สัดส่วน N-P-K = 4-1-5

สัดส่วนปุ๋ยปัจจุบันที่ใกล้เคียง = 3-1-4 หรือสูตรปุ๋ย 15-5-20

เฉลี่ยปริมาณธาตุอาหารติดไปกับผลทุเรียน

N: ~ 2.15%
P₂O₅: ~ 0.88%
K₂O: ~ 4.90%

↓

(N / P₂O₅): 2.18/0.88
= 2.48

(K / P₂O₅): 4.90/0.88
= 5.57


↓



สัดส่วน N-P-K = 2.5-1-5.5


สัดส่วนปุ๋ยปัจจุบันที่ใกล้เคียง = 3-1-5, 3-1-7 หรือสูตรปุ๋ย 15-5-25, 14-7-35 และ 15-5-35

อัตราการดูดใช้ปุ๋ยของมะเขือเทศ




ที่มา: ปรับปรุงจาก Huett, 1985


อัตราการดูดใช้ปุ๋ยของเมล่อน




ปุ๋ยโยกหน้า, ปุ๋ยโยกหน้า-หลัง และปุ๋ยโยกหลัง



ปุ๋ยโยกหน้า



ปุ๋ยโยกหน้า-หลัง




ปุ๋ยโยกหลัง

ปรับปรุงจาก: รศ.ดร.รวิ เสฐฐักดิ์



การพัฒนาของผลทุเรียน แบบ ชิกมอยด์

การเจริญพัฒนาผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง



ปรับปรุงจาก: รัชดาภรณ์ จันทาศรีและคณะ, พ.ศ. 2549

การพัฒนาผลแบบชิกมอยด์ ของผลแอปเปิ้ล

การพัฒนาผลแบบดัดเบิ้ลชิกมอยด์ ของผลเชอร์รี่


ปรับปรุงจาก: Leopold, ค.ศ. 1975



MARDUBA

การพัฒนาของผลทุเรียนกับปริมาณน้ำ

มาร์ดูไบ
น้ำหนักผล (กก.)




ปรับปรุงจาก: อรอนงค์ (พ.ศ.2548)



มาร์ดูไบ

การเจริญพัฒนางองใบไม้ผล-ไม้ยืนต้น



การเจริญพัฒนางองใบไม้ผล-ไม้ยืนต้น (1 รอบปี)



แตกใบอ่อน
(Initial)

ใบหางปลา
(Longtail leaf)

ใบคลี่กาง
(Leaf spacing)

ใบเฟสลาด/ใบพวง
(Mature)

ใบแก่
(Matured)

3 วัน

7 วัน

20-25 วัน

7-14 วัน

10-12 เดือน

40-50 วัน

60-75 วัน

ใบชุดใหม่

*** ใน 1 รอบปี จะมีใบโดยประมาณ 5-6 ชุดใบ ***



ธาตุอาหารพืช หรือปุ๋ย ที่ระบุบนกระสอบ



N - P - K
21 - 7 - 18



ใบ — ดอก — ผล
ใช้ หรือ ไม่ใช้



ธาตุอาหารพืช หรือปุ๋ย ที่ระบุบนกระสอบ



ปุ๋ยคอปาวด์ สูตร 15-5-25 +S

(ปุ๋ยซิลิเฟตแท้ เกรดละลายน้ำ) ขนาด 25 กิโลกรัม

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

- ไนโตรเจน ทั้งหมด (N)15%
- ฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ (P_2O_5)5%
- โพแทสเซียม ที่ละลายน้ำ (K_2O)25%

มีธาตุอาหารรอง

- กำมะถัน (S)7%



ไนโตรเจน



ไนโตรเจน+ซัลเฟต



ไนโตรเจน+ฟอสเฟต



โพแทสเซียม + ซัลเฟต



โพแทสเซียม+คลอไรด์



ปุ๋ยอินทรีย์เคมี.. ธาตุอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์.. หรือเคมี..?



ดัชนีความเค็มของปุ๋ย (Salt index)

สูตรปุ๋ย	ความเค็มเทียบ ปุ๋ยโซเดียมไนเตรท	ค่าความเค็ม ต่อหน่วย
โซเดียมไนเตรท... (16.5%N)	100.0	6.060
แอมโมเนียมไนเตรท (34-0-0)	104.0	3.059
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0 +24%S)	68.3	3.252
ยูเรีย (46-0-0)	74.4	1.618
ยูเรีย-แอมโมเนียมไนเตรท (28-0-0) และ (32-0-0)	63.0 และ 71.1	2.250 และ 2.221
แคลเซียมไนเตรท (15-0-0 +26%Ca)	65.0	4.194
ซูเปอร์ฟอสเฟต (0-20-0)	7.8	0.390
ทรีปเบิลซูเปอร์ฟอสเฟต (0-45-0)	10.1	0.224
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (11-52-0) และ (10-50-0)	26.7 และ 24.3	0.405



ดัชนีความเค็มของปุ๋ย (Salt index)

สูตรปุ๋ย	ความเค็มเทียบ ปุ๋ยโซเดียมไนเตรท	ค่าความเค็ม ต่อหน่วย
โซเดียมไนเตรท... (16.5%N)	100.0	6.060
โดแอมโมเนียมฟอสเฟต: DAP (18-46-0)	29.2	0.456
แอมโมเนียมฟอสเฟต (10-34-0)	20.0	0.455
โพแทสเซียมคลอไรด์: MOP (0-0-60)	116.2	1.936
โพแทสเซียมไนเตรท (13-0-46)	69.5	1.219
โพแทสเซียมซัลเฟต: SOP (0-0-50 +18%S)	42.6	0.852
โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (0-52-34)	8.4	0.097
แมกนีเซียมซัลเฟต (10%Mg, 14%S)	44.0	2.687
ยิบซัม (23%Ca, 17%S)	8.1	0.247



ค่า EC ย่อมาจาก (Electrical conductivity)

วัดค่า “ไฟฟ้าประจุที่วบวก-ลบ”

mS/cm = มิลลิซีเมน ต่อเซนติเมตร

dS/m = เดซีซีเมน ต่อเมตร

uS/cm = ไมโครซีเมน ต่อเซนติเมตร

1.0 mS/cm หรือ dS/m
เท่ากับ 1,000 uS/cm



เปิด-ปิด

โฮลด์/อุณหภูมิ

เลือกวัดค่า



ปุ๋ยเคมีอันตราย แต่ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ปลอดภัย.?



ไนโตรเจน ที่พืชดูดนำไปใช้ได้ คือ NO_3^- และ NH_4^+ (รวมถึงกรดอะมิโน)





ปุ๋ยเคมี ใช้ร่วมกับ ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ ดีที่สุด..



อินทรีย์วัตถุในดิน (ความชื้นอันสูงสุด) = 5%

องค์ประกอบของดินที่เหมาะสมกับพืช (ในอุดมคติ)



อินทรีย์วัตถุ (SOM) 5%

- ฮิวมัส (Humus) ~70%
- สารฮิวมิก (HS) ~30%
- ฮิวมิน (Humin)
- กรดฮิวมิก (HA)
- กรดฟุลวิก (FA)
- กรดอะมิโน (AA)
- กรดอินทรีย์

ดินมีชีวิต (จุลินทรีย์ กิ่งกือ ตะขาบ ไส้เดือนดิน)



การจำแนกเกรดปุ๋ยตามปริมาณปุ๋ย

การจำแนกเกรดปุ๋ยตามระดับสูตรปุ๋ยธาตุหลัก (ผลรวมเปอร์เซ็นต์ N-P-K)

1) ปุ๋ยสูตรต่ำ (Low): < 15%

2) ปุ๋ยสูตรกลาง (Medium): 15-25%

3) ปุ๋ยสูตรสูง (High): 26-30%

4) ปุ๋ยสูตรเข้มข้น (Concentrated): > 30%



การหว่านปุ๋ย อัตรา และความถี่



การหว่านปุ๋ย อัตรา และความถี่

15-5-25

N-P-K

รวม

7%

มากกว่า
35% ขึ้นไป

หว่าน : 1 จีด/Øทรงพุ่ม 1 ม.
ต่อเดือน (โดยประมาณ)

6-3-3

N-P-K

รวม

12%
สูตรต่ำ

หว่าน : 3 จีด/Øทรงพุ่ม 1 ม.
ต่อเดือน (โดยประมาณ)



การหว่านปุ๋ย อัตรา และความถี่

6-3-3

N-P-K

รวม

12%

สูตรต่ำ

หว่าน : 3 จีด/Øทรงพุ่ม 1 ม.
ต่อเดือน (โดยประมาณ)



การหว่านปุ๋ย อัตรา และความถี่

ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยอินทรีย์
1 รอบ



ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยอินทรีย์
2-3 รอบ



ธาตุอาหารพืช (Plant nutrient)




ไนโตรเจน (Nitrogen : N)



การใช้ประโยชน์ของธาตุไนโตรเจน (N)


ปรับปรุงจาก: ยงยุทธ (2558)



NR : เอนไซม์ไนเตรท รีดักเทส, NiR : เอนไซม์ไนไตรท์ รีดักเทส, Urease : เอนไซม์ยูรีเอส
 FAD : ฟลาวิน อะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด์, FMN : ฟลาวิน โมโนนิวคลีโอไทด์, Fd : เฟอร์ดอกซิน (มี Fe-S เป็นโคแฟกเตอร์)
 ATP : สารให้พลังงาน (*เพิ่มเติม: ธาตุคลอรีน (Cl) เกี่ยวข้องทางอ้อมในกระบวนการโฟโตไลซิสของการสังเคราะห์แสงได้พลังงาน ATP)

การใช้ประโยชน์ของธาตุไนโตรเจน (N)

ปรับปรุงจาก: ยงยุทธ (2558)



* เพิ่มเติม : ธาตุคลอรีน (Cl) ในงานวิจัยใหม่ๆ พบว่า ถ้ามีปริมาณที่เหมาะสมช่วยส่งเสริมการใช้ไนโตรเจน โดยเกี่ยวข้องกับวิถี GS-GOGAT และเกี่ยวข้องต่อการเร่งกระบวนการหายใจแสง (Photorespiration) ซึ่งปลดปล่อยแอมโมเนียม (NH_4^+) ออกมา

GS : เอนไซม์กลูตามีน ซินเทเทส, GOGAT : เอนไซม์กลูตาเมต ซินเทส, NADH และ NADPH : ตัวถ่ายเทอิเล็กตรอน



บทบาทของธาตุหลัก : ไนโตรเจน (N)

ที่มา: ยงยุทธ โอสภสกา (2558)

บทบาท : เป็นองค์ประกอบของ “กรดอะมิโน” หน่วยย่อยของโปรตีน
ไนโตรเจน + อัลฟาออกโซกลูตาเลต (ผลิตผลจากการหายใจ /วัฏจักรเครบส์)



“กรดอะมิโน (Amino acid)”




โปรตีน (เอนไซม์ และองค์ประกอบสารอินทรีย์โปรตีน)





เอนไซม์ = เร่งปฏิกิริยา (Catalysis) [เมตาบอลิซึม]

ที่มา: ยงยุทธ โอสดสภา (2558)



[Induced fit theory การเหนี่ยวนำให้เข้ารูป]




กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนบางชนิด

ที่มา: ยงยุทธ โอสภา (2558)

ฮอร์โมน : ออกซิน (Auxin)

▶ ไอเอเอ (IAA)




สารตั้งต้น คือกรดอะมิโนทริปโตเฟน

อนุพันธ์ของ ไอโซเพนทีลอะดีนีน

ไซโตไคนิน (Cytokinin)


▶ ซีเทอีน (Zeatin)



บทบาทของธาตุหลัก : ไนโตรเจน (N)

ที่มา: ยงยุทธ โอสดสภา (2558)

องค์ประกอบ “กรดนิวคลีอิก” : สารพันธุกรรม (DNA, RNA)




องค์ประกอบ “โคแฟกเตอร์ และ กรดชาลิโซลิก” [ฟีนอลอะลามีน]
องค์ประกอบ “ATP, ADP, NAD^+ , $NADP^+$, FAD และ Co-Enzyme A”
สะสมในรูป “อัลคาลอยด์” เช่น นิโคติน, มอร์ฟีน
บทบาททางสรีระวิทยา เช่น เพปไทด์ และพอลิเอมีน



โบโตรเจน ต่อบทบาท “การสังเคราะห์ด้วยแสง”

ที่มา: ยงยุทธ โอสดสภา (2558)



ส่วนหัว (Porphyrin ring)
แมกนีเซียม 1 ตัว (อะตอม)
โบโตรเจน 4 ตัว (อะตอม)

ส่วนหาง (Phytol tail)

Jynto (talk), 31 July 2011. [wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll-a-3D-balls.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll-a-3D-balls.png)




ฟอสฟอรัส (Phosphorus : P)



พืชดูดธาตุฟอสฟอรัสในรูป : ฟอสเฟต


ที่มา: ยงยุทธ โอสดสภา (2558)






การใช้ประโยชน์ฟอสฟอรัสของพืช

ที่มา: ยงยุทธ โอสดสภา (2558)

P = 5-15%
นำไปใช้ (เมตาบลิซึม)




P = 85-95%
เก็บสำรอง ในถุงเก็บสาร (ถุงแวคิวโอล : Vacuole)



บทบาทของธาตุหลัก : ฟอสฟอรัส (P)

ที่มา: ยงยุทธ โอสดสภา (2558)

องค์ประกอบ “กรดนิวคลีอิก” : สารพันธุกรรม (DNA, RNA)



เชื่อมสายพันธุกรรม “DNA” (HPO_4^{2-}) และการทำงานของยีน
องค์ประกอบ “ฟอสโฟลิพิด” ของเยื่อหุ้ม

องค์ประกอบของ “ATP, ADP, NAD^+ , NADP^+ , FAD” (รีไซเคิล ได้)

สะสมในรูป “กรดไฟติก หรือ ไฟเตท” (การงอกของเมล็ดและละอองเรณู)

องค์ประกอบอื่นๆ RuBP (การตรึงคาร์บอน), กลูโคส-6-ฟอสเฟต (ไกลโคไลซิส)

ฟรุกโตส-1-6-ฟอสเฟต (ไกลโคไลซิส กับ วัฏจักรคาลวิน)



โพแทสเซียม (Potassium : K)



การใช้ประโยชน์โพแทสเซียมของพืช : ไอออนอิสระ (K^+)

ที่มา: ยงยุทธ โอสกสภา (2558)

โคแฟกเตอร์ / กระตุ้น (Cofactor / Activator)

เช่น เอนไซม์การสะสมแป้ง,
เอทีพีเอส (ATPase),
โปรตอน เอทีพีเอส (H^+ ATPase),
เอนไซม์รูบิสโค (ตรึงคาร์บอน)
และเอนไซม์อื่นๆ มากกว่า 60 ชนิด

มีบทบาทสังเคราะห์โปรตีน
เชื่อม tRNA กับไรโบโซม

รักษาสสมดุลไอออน (K^+ / anion)

เป็นไอออนเดียวที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์
(แม้มีในไซโตซอล 100-150 mM)

ควบคุมศักย์ออสโมซิส, ในพืช
ทำปฏิกิริยา แล้วไม่ตกตะกอน



ทำให้เอนไซม์คงสภาพ-เพิ่มกิจกรรม, รักษาสมดุล pH ในพืช
ควบคุมการเปิด-ปิดปากใบ, ควบคุมการขยายขนาด, รักษา
สภาพคลอโรพลาสต์

ควบคุมการเคลื่อนย้ายสารอาหารและธาตุในท่อลำเลียงอาหาร
(Phloem loading)




ธาตุรอง 1

(Secondary nutrient element)



บทบาทธาตุรอง : แคลเซียม, แมกนีเซียม และกำมะถัน

ที่มา: ยงยุทธ โอสดสภา (2558)



บทบาทธาตุรอง : กำมะถัน (S)

ที่มา: ยงยุทธ โอสกสภา (2558)

องค์ประกอบ “กรดอะมิโน” : เมไทโอนีน (Met.) และ ซีสเทอีน (Cys.)

↓
พืชนิวโมลัสระบบบางตัว ← แอสคอร์เบท + กลูตาไธโอน (Glutathione)
(รวมถึงสารพิษอื่นๆ) (วิตามิน ซี) กลูตามีน (Gln.) + ซีสเทอีน (Cys.) + ไกลซีน (Gly)

↓
Phytochelatin-Cd ← ดักจับโลหะหนัก ← ไฟโตคีเลติน (Phytochelatin)
[กลูตามีน + ซีสเทอีน]_{n2-11} + ไกลซีน (Gly)

องค์ประกอบ “ไฟโตโครม” เช่น ควบคุมการงอกของเมล็ด

องค์ประกอบ “สารระเหย” เช่น อัลลีอิน, กลูโคซิโนเลต, น้ำมันมาสตาร์ด



บทบาทธาตุรอง : แคลเซียม (Ca)

ที่มา: ยงยุทธ โอสดสภา (2558)

เป็นแคลเซียม-แอฟเทก

**ส่งเสริมการปฏิสนธิ, การงอกของเมล็ด (เป็นโคแฟกเตอร์ย่อยแป้ง, แรงการยืดของ
โคลออปโทด)**

**รักษาสภาพเยื่อหุ้ม (ควบคุมคัดเลือกการดูดไออน, ป้องกันการรั่วไหลของสาร,
ป้องกันเยื่อหุ้มเสื่อมสภาพจากภาวะวิกฤต)**

เป็นตัวนำรหัสสัญญาณที่ 2







MARS CUBE

มาร์คคิวบ์

การกระจายตัวของแคลเซียม - ดำรงดุลแคลเซียม

ที่มา: ยงยุทธ โอสดสภา (2558)



 = แคลเซียม

อะพลาสต์ (Apoplast)

: pH 4-5

ไซโทซอล (Cytosol)

: pH 7.4, -120 mV

เซลล์พืช


ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)

เมทริกซ์ : pH 8, -80 mV

ช่องว่างเยื่อหุ้ม : pH 7, -240 mV


แวคิวโอล (Vacuole)

: pH 5.5, -90 mV



มาร์คคิวบ์

แคลเซียม เชื่อมโพลีแซคไคด์




มิดเดิลลามล้า (Middle Lamella)
 ผนังเซลล์ (Cell wall)
 เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)



เซลลูโลส (Cellulose)


ไมเซลล์ (Micell)



เส้นใยเซลลูโลส (Cellulose Microfibril)

มิดเดิลลามล้า (Middle Lamella)

ผนังเซลล์




เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose)

เพกติน (Pectin)

เยื่อหุ้มเซลล์

เซลล์พืช



กรดเพกติก (Pectic acid)

ปรับปรุงจาก: รศ.ดร.ยงยุทธ โอสภสภา, 2558

แคลเซียม : เป็นตัวนำรหัสสัญญาณที่ 2

ที่มา: ยงยุทธ โอสกุล (ไม่ทราบปีพิมพ์)

มาร์คดูไบ

อะพพลาสต์

ไซโทซอล

1. กระตุ้น

ตัวรับ

2. ถ่ายทอดสัญญาณ


ตัวถ่ายทอดสัญญาณ เช่น Ca^{2+} , ไซคลิก นิวคลีโอไทด์, ฟอสโฟลิพิด, น้ำตาล, กระอะมีโน

3. การตอบสนอง

- ไมโทคอนเดรีย
- แวกลิโอล
- คลอโรพลาสต์
- ร่างแหเอนโดพลาซึม

เซนเซอร์โปรตีน


- Calmodulin (CaM)
- Calmodulin-like (CML)
- Ca^{2+} dependent protein kinases (CDPKs)



บทบาทธาตุรอง : แมกนีเซียม (Mg)

ที่มา: ยงยุทธ โอสภสภา (2558)

เป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ ที่ใช้ตรึงคาร์บอน (สังเคราะห์แสง)
เป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์เอทีพีเอส (ATPase)



ส่วนหัว (Porphyrin ring)
แมกนีเซียม 1 ตัว (อะตอม)
ไนโตรเจน 4 ตัว (อะตอม)

ส่วนหาง (Phytol tail)

Jynto (talk), 31 July 2011. [wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll-a-3D-balls.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll-a-3D-balls.png)





จุลธาตุ (Micronutrient)



บทบาทของจุลธาตุ (ธาตุเสริม) ต่อการต้านอนุมูลอิสระ


ที่มา: ยงยุทธ ไขสกลภา (2558)




* ไอออนอิสระของจุลธาตุบางตัว เช่น เหล็ก และทองแดง สร้างอนุมูลอิสระได้เช่นกัน ซึ่งเกิดจาก H_2O_2




ธาตุอาหารที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง




ธาตุอาหารที่ไม่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง



โบรอน เชื่อมเส้นใยเซลลูโลส



- มิดเดิลลามล้า (Middle Lamella)
- ผนังเซลล์ (Cell wall)
- เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)



เส้นใยเซลลูโลส

มิดเดิลลามล้า (Middle Lamella)



เส้นใยเซลลูโลส
(Cellulose Microfibril)

เฮมิเซลลูโลส
(Hemicellulose)

เพกติน
(Pectin)


เยื่อหุ้มเซลล์

เซลล์พืช



ปรับปรุงจาก: รศ.ดร.ยงยุทธ โอสดสภา, 2558

การมีไนเตรทในเนื้อเยื่อมากเกินไป อาจทำให้เกิดการขาดธาตุเหล็ก




อาการขาดธาตุ, (Plant deficiency)



การเคลื่อนที่ (Mobility) ของธาตุในโฟลเอ็ม (Phloem)

ที่มา: ยงยุทธ โอสดสภา (2558)



อาการขาดธาตุอาหารของพืช

อาการขาดเกิดขึ้นที่ใบอ่อน :

จุลธาตุ / ธาตุอาหารเสริม : พบบ่อย เช่น เหล็ก สังกะสี แมงกานีส และโบรอน , ไม่ค่อยพบ เช่น ทองแดง โมลิบดีนัม คลอรีน นิเกิล (โบรอน : เกาแตก ลำต้นกลวง ใต้ผลลัม)
ธาตุรอง : แคลเซียม และจุลธาตุ โบรอน พบที่ยอดอ่อน ดอก ผล

อาการขาดเริ่มจาก/พบมากในใบพื้งแก่ :

ธาตุรอง : แมกนีเซียม, กำมะถัน

อาการขาดเกิดขึ้นกับใบล่างก่อนเสมอ :

ธาตุหลัก : ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (โพแทสเซียม : ผลใกล้สุกแก่)

พืชผัก, ไม้ดอกไม้ประดับ, พืชไร่ พืชล้มลุก



อาการขาดธาตุอาหารของพืช

อาการขาดเกิดขึ้นที่ใบอ่อน :

จุลธาตุ / ธาตุอาหารเสริม : พบบ่อย เช่น เหล็ก สังกะสี แมงกานีส และโบรอน , ไม่ค่อยพบ เช่น ทองแดง โมลิบดีนัม คลอรีน นิเกิล (โบรอน : ผลก่อนระยะเก็บเกี่ยว)

ธาตุรอง : แคลเซียม และจุลธาตุ โบรอน พบที่ยอดอ่อน ดอก ผล

อาการขาดเริ่มจาก/พบมากในใบพื้งแก่ :

ธาตุรอง : แมกนีเซียม, กำมะถัน

อาการขาดเกิดขึ้นกับใบล่างก่อนเสมอ :

ธาตุหลัก : ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม (โพแทสเซียม : ผลก่อนระยะเก็บเกี่ยว)

พืชผัก, ไม้ดอกไม้ประดับ, พืชไร่ พืชล้มลุก



อาการขาดธาตุอาหารของพืช

อาการขาดธาตุอาหารของพืชเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย!!!



ตัวอย่างสาเหตุการขาดธาตุ เช่น

1. คุณสมบัติชนิดของดิน : ดินทรายไม่ดูดซับธาตุ ดินเหนียวจะดูดซับและตรึงธาตุประจุบวกไว้แน่น จนพืชนำไปใช้ได้ยาก
2. pH ของดิน : มีผลโดยตรงต่อการละลายและความเป็นประโยชน์ของธาตุ pH 5.5-6.8 เหมาะสม
3. ดินขาดอินทรีย์วัตถุ : อินทรีย์วัตถุช่วยดูดซับธาตุและค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุ
4. การใส่ปุ๋ยไม่ครบ หรือใส่ปุ๋ยธาตุใดธาตุหนึ่งมากเกินไป
5. ฟ้าปิดฝนตกต่อเนื่องนานมากกว่า 4-5 วัน หรืออุณหภูมิสูง มีลมโชย พืชคายน้ำมากกว่าปกติ ทำให้ขาดแคลเซียม และโบรอน ฯลฯ



ลักษณะอาการขาด : จุลธาตุ (ที่พบบ่อย)

© Thirasak Chuchoet

ใบอ่อน-ใบเพสลาด
บ่อยครั้งที่พบขาดหลายธาตุร่วมกัน

ตำแหน่งใบที่พบ
อาการขาดธาตุเริ่มต้น

ใบกิ่งแก่-ใบแก่ชุดใหม่

อาการเริ่มต้น: เส้นใบคล้ายกางปลาชั้นโต

ขาดสังกะสี

ขาดแมงกานีส

ขาดเหล็ก

ขาดสังกะสี:
ใบเรียวยาว เล็ก ใบไม่ขยาย ขอบใบบิด ใบเป็น
ลอนคลื่น ใบอาจโค้งคล้ายพระจันทร์
และเหลืองระหว่างเส้นใบ

แมงกานีส:
เนื้อใบเป็นสีเขียวอ่อน ค่อนข้างเรียบเสมอ
ทั้งใบ ต่อมาจะมีสีเหลืองอมเขียวอ่อน เส้น
ใบยังมีสีเขียว/เขียวอ่อน ทั้งเส้นกลางใบ-
เส้นใบย่อยคล้ายกางปลาชั้นเล็ก บางครั้ง
เส้นใบคล้ายร่างแห ใบยังขยายขนาดได้

เหล็ก:
เนื้อใบเหลือง เส้นใบมีสีเขียวอ่อน ต่อมา
ใบจะขีดเหลืองหรือขีดเหลืองอมขาว
ใบยังขยายต่อได้

ขาดแมกนีเซียม

อาการขาดธาตุอาหารของพืช



สังกะสี
(Zinc)

แมงกานีส
(Manganese)

เหล็ก
(Iron)

แมกนีเซียม
(Manganese)



อาการขาดธาตุสังกะสี (Zinc deficiency)



อาการขาดธาตุสังกะสี (Zinc deficiency)



อาการขาดธาตุแมงกานีส (Manganese deficiency)



อาการขาดธาตุแมงกานีส (Manganese deficiency)



อาการขาดธาตุแมงกานีส (Manganese deficiency)



อาการขาดธาตุแมงกานีส (Manganese deficiency)



อาการขาดธาตุแมงกานีส (Manganese deficiency)



อาการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency)



อาการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency)



อาการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency)



อาการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency)



อาการขาดเป็น “แพ็คทอง”



โรคเข้าชำ



พาดธาตุเป็น “แพ็คเกจ” เหล็ก (Fe)+สังกะสี (Zn)+แมงกานีส (Mn)



พาดธาตุเป็น “แพ็คเกจ” เหล็ก (Fe)+สังกะสี (Zn)+แมงกานีส (Mn)



พาดธาตุเป็น “แพ็คเกจ” เหล็ก (Fe)+สังกะสี (Zn)+แมงกานีส (Mn)



ธาตุที่เป็น “แพ็คเกจ” เหล็ก (Fe)+สังกะสี (Zn)+แมงกานีส (Mn)



พาดธาตุเป็น “แพ็คเกจ” เหล็ก (Fe)+สังกะสี (Zn)+แมงกานีส (Mn)



อาการขาดธาตุแมกนีเซียม (Magnesium deficiency)



อาการขาดธาตุแมกนีเซียม (Magnesium deficiency)



อาการขาดธาตุแมกนีเซียม (Magnesium deficiency)



อาการขาดธาตุแมกนีเซียม (Magnesium deficiency)



อาการขาดธาตุแคลเซียม (Calcium deficiency)



อาการขาดธาตุแคลเซียม (Calcium deficiency)



อาการขาดธาตุแคลเซียม (Calcium deficiency)



Photo by: Hoong Zhun Chan



Photo by: Hoong Zhun Chan



Photo by: Hoong Zhun Chan



อาการขาดธาตุแคลเซียม (Calcium deficiency)

อาการตาฝ้า
เนื้อดำ
เนื้อแข็งเป็นไต



อาการขาดธาตุโบรอน (Boron deficiency)



Photo : Hoong Zhun Chan



Photo : Hoong Zhun Chan



อาการขาดธาตุโบรอน (Boron deficiency)



อาการขาดธาตุโบรอน (Boron deficiency)



อาการธาตุโบรอนเป็นพิษ (Boron toxicity)



ทุเรียน “มีแนวโน้ม” ต้องการธาตุโบรอนมาก (แต่ไม่ควรใส่ทางดิน)



อาการธาตุโบรอนเป็นพิษ (Boron toxicity)



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)



ขอบใบเหลืองเหมือนภาษาอังกฤษตัว V



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)



ขอบใบเหลืองเหมือนภาษาอังกฤษตัว V



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)



แฉีกแฉ่ง โพแทสเซียม (บน)-แมกนีเซียม (ล่าง)



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)

ภาวะ “โรคแทรกซ้อน” (โรคใบจุด-ขอบใบไหม้ เชื้อรา “ไฟทอปซีส”)



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)

อาการขาดโพแทสเซียมรุนแรงมาก (ส่วนนี้ปลุกในพื้นที่ดินทรายจัด)



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)



ทุเรียน “เนื้อลายเสือ” เมื่อสุกแก่จะสุกครึ่ง-ไม่สุกครึ่ง (กินไม่ได้)



อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)



ใน 1 เม็ด นุ่มฉ่ำหนึ่ง-อีกฉ่ำเนื้อแข็งไม่มีรสชาติ



อาการปลายใบไหม้ ที่แลดูคล้ายอาการขาดธาตุ

โรคแอนแทรคโนส
แทรกซ้อน



อาการปลายใบไหม้ ที่เกิดจากความเค็ม (Salt toxicity)



อาการปลายใบไหม้ ที่เกิดจากความเค็ม (Salt toxicity)



ขอบใบเหลืองเหมือนภาษาอังกฤษตัว V



อาการปลายใบไหม้ ที่เกิดจากความเค็ม (Salt toxicity)



อาการปลายใบไหม้ ที่เกิดจากความเค็ม (Salt toxicity)



อาการปลายใบไหม้เกิดขึ้นมาได้สักพักใหญ่ (จนบางครั้งหาต้นต่อไม่พบ)



อาการปลายใบไหม้ ที่เกิดจากความเค็ม (Salt toxicity)



อาการปลายใบไหม้เกิดขึ้นมาได้สักพักใหญ่ (จนบางครั้งหาต้นต่อไม่พบ)



ปลายใบ-ขอบใบเหลือง และไหม้ จากโซเดียม (Sodium toxicity)



น้ำที่ใช้รดเป็น “น้ำที่บำบัดวิธีการทั่วไป ใกล้โรงงาน” เมื่อนำน้ำไปตรวจ พบ “โซเดียมเข้มข้น”

ปลายใบ-ขอบใบเหลือง และไหม้ จากโซเดียม (Sodium toxicity)

เมื่อนำน้ำไปตรวจ พบ “โซเดียมเข้มข้น”



ปลายใบ-ขอบใบเหลือง และไหม้ จากโซเดียม (Sodium toxicity)

เมื่อนำน้ำไปตรวจ พบ “โซเดียมเข้มข้น”



ปลายใบ-ขอบใบเหลือง และไหม้ จากโซเดียม (Sodium toxicity)

เมื่อนำน้ำไปตรวจ พบ “โซเดียมเข้มข้น”



ปลายใบ-ขอบใบไหม้ จากซิงค์ออกไซด์ (Zinc toxicity)



ปลายใบ-ขอบใบไหม้ จากซิงค์ออกไซด์ (Zinc toxicity)




ปลายใบ-ขอบใบไหม้ จากซิงค์ออกไซด์ (Zinc toxicity)



อาการใบเหลืองจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืช (Nematodes)

ภาพถ่ายด้วยวเลนส์ขยาย 80-100 เท่า



ไส้เดือนฝอย (Nematodes)

— ไส้เดือนฝอยรากแผล (Lesion nematodes: *Pratylenchus* spp.) —



มาร์คูโบ



อาการใบเหลืองคล้ายอาการขาดธาตุ แต่มีความแตกต่าง





M U D D U B B A

มาร์คูไบ



มาร์คูไบ

© Thirasak Chuchoet



© Thirasak Chuchoet





MARDUUBAI


มาร์คูไบ



© Thirasak Chuchoet











MARDUBAI

มาร์คูไบ







MARDUBA

มาร์ดูใบ



ใบเหลืองผิดปกติจากเอทิลีนมากเกินไป (Excessive Ethylene)



ใบเหลืองผิดปกติจากเอทิลีนมากเกินไป (Excessive Ethylene)



เหลืองผิดปกติจากไเอทรีฟไเอเลต (Excessive Ethylene)



เหลืองผิดปกติจากไเอทรีฟไเอเลต (Excessive Ethylene)



การทิ้งผลที่ตัดแต่ง/หลุ่ร่วง และผลสุกแก่ตัดลงมาแล้ว



เฮ้อ!!
ฟังแล้วท้อ..

ยังฟัง-ยังเหนื่อยใจ!!

