

Plan de Inmunizacion y analisis, Revision de desarrollo

Recien nacido	Hepatitis B (si no fue dado en el hospital)
1 MES	Hep B #2 (debe ser 28 dias despues #1)
2 MESES	DTaP, IPV, HIB (Pentacel), Prevnar, Rotateq
4 MESES	DTaP, IPV, HIB (Pentacel), Prevnar, Rotateq
6 MESES	DTaP, IPV, HIB (Pentacel), Prevnar, Rotateq FLU (Flu #2 vencerá en 28 días)
9 MESES	Hep B #3, Hemoglobina (Hgb), Plomo, Cuestionario Edades y Etapas
12 MESES (a el año cumplido)	Varivax, MMR, Prevnar, Hep A #1
15 MESES	DTaP, HIB, Hep A #1 (si no se dio a los 12meses)
18 MESES	Hep A #2, MCHAT Screening, Plomo, Hemoglobina (Hgb)
23 MESES	Hgb/Plomo (si no se dio a los 18 meses), MCHAT
30 MESES	Cuestionario Edades y Etapas
3 AÑOS	PPD (si esta indicado), Cuestionario Edades y Etapas
4 AÑOS (a los 4 años cumplidos)	DTaP, IPV, MMR, Varivax, Cuestionario Edades y Etapas
5 AÑOS	Hgb, TC / HDL (exam de colesterol)
11 AÑOS	Tdap, Menactra, Gardasil serie de (HPV), TC / HDL, Hgb
16 AÑOS	Menactra, Trumenba, la serie de HPV (si no a sido completada)

La Academia Americana de Pediatría recomienda realizar exámenes anuales de 5 años a 21 años de edad. La vacuna contra la gripe se recomienda para pacientes de 6 meses o más, que generalmente se administran de agosto a junio.

Se recomiendan tratamientos con flúor desde los 9 meses hasta los 35 meses hasta 3 veces al año.

En Pediatric Health Associates, seguimos las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y el Centro para el Control de Enfermedades y exigimos que todos los pacientes estén vacunados. La falta de vacunación de su hijo dentro de los 4 meses posteriores a la primera visita será motivo de expulsión de la práctica. Requerimos que el niño reciba al menos 2 vacunas inyectables y una vacuna oral si es necesario en cada visita cuando se necesitan vacunas. El paciente debe ser inmunizado con MMR a los 15 meses.

Updated 10/2012 Updated 1/2021

Updated 5/2014

Updated 4/2016

Updated 1/2019

Updated 4/2019