

INFORMATIE & RISICO'S BIJ HET ZETTEN VAN EEN TATOEAGE

Lees de volgende informatie zorgvuldig door en stel de tatoeëerder op de hoogte indien u twijfelt aan uw geschiktheid om te worden getatoeëerd.

Een tattoo is handwerk op een lichaam. Daardoor kan een tattoo altijd iets anders uitvallen dan het ontwerp op papier. Dit omdat elke huid en lichaamsplek anders is. Het is dan ook nooit van te voren te voorspellen hoe een tattoo geneest. Dit doordat elke huid elk lichaam, afweersysteem en bindweefsel anders is. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de inkt "vloeit" in de huid. Dit is nooit uit te sluiten en is afhankelijk van uw bindweefsel. Helaas is het risico op een blow-out of het veel dikker worden van het lijnwerk niet op voorhand uit te sluiten.

Risicovolle plekken:

- Waar veel beweging is zoals ribben, heupen, nek, enkels en polsen.
- Door grote gewichtstoename- of afname (zwangerschap) heupen, buik, bovenbenen of bovenarmen.

Houd er ook rekening mee dat een tattoo nooit zo zwart blijft als wanneer deze net is gezet. Ook hierin geldt dat er vele lichaamsfactoren zijn en bloedstelling aan de zon die hier invloed op kunnen hebben.

Over het algemeen zal een fineline tattoo lichter genezen dan een dik getatoeëerde lijn. Bijwerken is dan ook alleen aan te raden wanneer er echt stukjes missen in een lijn. Een tattoo in zijn geheel bijwerken om het zwarter te maken brengt het risico met zich mee dat de tattoo (veel) dikker kan worden.

- Tatoeëren en het genezingsproces kunnen gepaard gaan met risico's en mogelijke complicaties, zoals u hier kan lezen. U krijgt mondeling en schriftelijk uitleg over de nazorg om u te helpen de effecten te minimaliseren.
- Het is normaal dat tatoeëren gepaard gaat met pijn, roodheid en zwellingen. Als deze symptomen tijdens het genezingsproces verergeren, kan dit een teken van een infectie zijn en zou u een arts moeten raadplegen.
- Sommige complicaties kunnen verband houden met uw gezondheidssituatie. Het is belangrijk voor uw veiligheid dat de tatoeëerder daarvan op de hoogte wordt gebracht. Er kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.
- Tatoeages zijn blijvend en het is mogelijk, afhankelijk van de inkt die is gebruikt, dat ze niet goed kunnen worden verwijderd. Het is goed te weten dat we bij Tattoo Studio 1735 alleen REACH goedgekeurde inkt gebruiken.
- Bij twijfel behoort de behandeling te worden uitgesteld en behoort er medisch advies te worden ingewonnen.

Laat geen tatoeage aanbrengen:

- als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
- als u onder de invloed van alcohol of drugs bent;
- * op een moedervlek of een litteken dat is overgebleven na het verwijderen van een melanoom.

Indien een van de onderstaande omstandigheden of aandoeningen op u van toepassing zijn en u toch een tatoeage wenst, raadpleeg dan eerst uw arts en vraag advies.

De volgende omstandigheden of aandoeningen brengen mogelijk een hoger risico van complicaties met zich mee:

- 1) Huid:
 - a) huidinfectie ongeacht de locatie en de soort infectie
 - b) huiddelen die beschadigd of abnormaal lijken, waaronder moedervlekken
 - c) eventuele huidziekten die actief zijn (bijvoorbeeld eczeem, psoriasis)
 - d) huiddelen die onderworpen zijn geweest aan plastische chirurgie of radiotherapie met inbegrip van recente littekens en keloïden (blijkens medisch advies)
 - e) een eerder getatoeëerde plek die nog niet volledig is genezen
 - f) een plek waar onlangs een tatoeage is weggelaserd of met een andere methode is verwijderd indien de wond nog niet is genezen
- 2) Algemene aandoeningen:
 - a) hemofilie of een andere stollingsziekte
 - b) epilepsie
 - c) bekende allergieën (bijvoorbeeld latexallergie)
 - d) diabetes
 - e) een auto-immuunziekte
 - f) immunosuppressie en aandoeningen met een gecompromitteerd immuunsysteem
 - g) sarcoïdose
 - h) hart- en vaatziekten

AANVULLENDE RISICO'S

VOOR ZWANGEREN EN VROUWEN DIE BORSTVOEDING GEVEN

Neem geen tatoeage als je zwanger bent of borstvoeding geeft. Niet alle risico's rondom het tatoeëren voor zwangere vrouwen zijn bekend. Mocht je bovendien als gevolg van de tatoeage een infectie oplopen, dan mag je bepaalde medicijnen ter bestrijding van de infectie niet gebruiken, vanwege het risico voor je (ongeboren) kind.

VOOR MENSEN DIE ANTIBIOTICA SLIKKEN

Slik je op dit moment of in de afgelopen 10 dagen antibiotica dan is echt af te raden om een tattoo te laten zetten. Dit kan namelijk een slechte invloed op het genezingsproces hebben.

VOOR MENSEN MET EEN BLOEDSTOLLINGSZIEKTE EN MENSEN DIE ANTISTOLLINGSMIDDELEN GEBRUIKEN

Wanneer je een bloedstollingsziekte hebt of antistollingsmiddelen gebruikt, kan je huid tijdens het tatoeëren sneller gaan bloeden en langer doorbloeden dan bij andere mensen. Om het risico op ernstige bloedingen zo klein mogelijk te maken, worden grote tatoeages afgeraden. Wil je toch een grote tatoeage, laat deze dan bij voorkeur in meerdere keren zetten.

VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE HUIDZIEKTE

In het geval van een chronische huidziekte (zoals bijvoorbeeld psoriasis of sarcoidose in de huid), bestaat de kans dat je je huidklachten ook ontwikkelt op de plaats die je hebt laten tatoeëren. Dit heet het Koebner fenomeen. Om de kans hierop te verkleinen, wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten op momenten dat je huidziekte erg actief is. En laat bij voorkeur ook geen tatoeage zetten op plekken waar je huidziekte vaak optreedt. Wanneer je ooit melanomen (huidkanker) hebt gehad, of dit in je familie voorkomt, wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten. Op de getatoeëerde huid zijn nieuwe melanomen moeilijker in een vroeg stadium te ontdekken.

VOOR MENSEN MET EEN HART- OF VAATZIEKTE

Als je een hart- of vaatziekte hebt, bestaat het risico dat je door tatoeëren endocarditis (een infectie aan de binnenwand van het hart) oploopt. Vanwege dit risico wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten wanneer je je hartaandoening niet optimaal onder controle hebt.

VOOR MENSEN MET EEN AFWEERSTOORNIS OF MEDICIJNEN DIE HET AFWEERSYSTEEM KUNNEN VERZWAKKEN

Ook als er veilig en hygiënisch wordt gewerkt, loop je bij het zetten van een tatoeage risico op infecties. Wanneer je een afweerstoornis hebt (hier valt ook leukemie onder) of medicijnen gebruikt die het afweersysteem kunnen verzwakken, is dit risico verhoogd.

