

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES SONT DE RETOUR !

Du printemps au début de l'été, les chenilles processionnaires représentent un vrai danger.

Leurs poils urticants provoquent des réactions allergiques, irritations et inflammation.

Les chiens, curieux et explorateurs, sont plus à risque. Chats, NAC et humains (en particulier les enfants) peuvent également être blessés.

En France, on retrouve deux espèces de chenilles processionnaires.

Chenille processionnaire du pin

Sud de la France (mais s'étend vers le Nord)

Pin (forêt et villes)

Les chenilles hibernent dans des nids blancs à l'extrémité des branches hautes. À partir de mars, elles descendent de l'arbre en file indienne (en « procession ») pour s'enfouir dans le sol puis se transformer en papillon.



Symptômes les plus fréquents :

- Hypersalivation importante
- Douleur intense (animal agité, qui se frotte le museau)
- Langue rouge et gonflée, parfois bleutée, gonflement des lèvres et du museau
- Vomissements, difficulté à avaler
- Démangeaisons violentes de la zone de contact
- Conjonctivite, yeux rouges ou larmoyants si projection dans les yeux

Cas sévères :

- Nécrose de la langue
- Détresse respiratoire si œdème important
- Choc allergique (rare mais possible)

Chenille processionnaire du chêne

Intégralité de la France

Chêne (forêt et villes)

Les œufs éclosent en avril. Les chenilles vivent dans des nids plaqués sur le tronc ou les branches et sortent en procession en fin de journée pour se nourrir. Elles restent sur l'arbre jusqu'à leur transformation en papillon, et ne se retrouvent au sol qu'exceptionnellement.

LES BONS RÉFLEXES :

Comment réagir ?

- Contactez immédiatement votre vétérinaire. Chaque minute compte !
- Protégez-vous à l'aide de gants en plastique.
- Empêchez votre chien de se lécher.
- Rincez les zones touchées avec de l'eau **SANS FROTTER.**
- Rendez-vous au plus vite chez votre vétérinaire : seule une prise en charge vétérinaire permet de limiter les complications.

Une alliée précieuse : la mésange

- Elle peut manger jusqu'à 500 chenilles par jour.
- Installer des nichoirs peut réduire la population de chenilles.
- D'autres prédateurs : chauves-souris, araignées, certains coléoptères, coucou gris.

