



## Qu'est-ce que le Panaris ?

**Le panaris** est une **infection bactérienne** aiguë des tissus sous-cutanés situés entre les ongloins. C'est l'une des pathologies podales les plus fréquentes en élevage bovin et elle provoque **des boiteries sévères** !

Pour détecter si l'une ou plusieurs de vos bêtes sont atteintes, il faut être attentif surtout en cette période d'hiver où la météo particulièrement humide favorise le développement de cette infection. En effet, la bactérie est naturellement présente dans les bouses et pénètre dans les tissus mous suite à une lésion cutanée interdigitale. Les conditions environnementales jouent donc un rôle déterminant dans l'apparition de cette pathologie. L'**excès d'humidité** fragilise l'épiderme interdigital et favorise la multiplication bactérienne.

Pour détecter l'apparition d'un panaris, il vous faut observer **4 critères essentiels**, qui doivent impérativement coexister:

- **L'inflammation** présente une symétrie au niveau de la couronne et du pâton.
- **La boiterie** apparaît brutalement, généralement du jour au lendemain.
- **L'intensité douloureuse** est telle que **l'animal supprime totalement l'appui** du membre atteint.
- **Une hyperthermie** (fièvre) accompagne systématiquement les signes locaux (chaleur et gonflement).

Dès que vous voyez apparaître ses signes, n'hésitez pas à **appeler votre vétérinaire sanitaire** ! Un diagnostic précoce et un traitement antibiotique adapté permettent la réussite thérapeutique de la pathologie.

**INFLAMMATION ; BOITERIE; HYPERTHERMIE**



## *Le super panaris*

Le super-panaris est une forme particulièrement sévère de panaris. Cette variante se caractérise par une progression foudroyante et des lésions étendues. L'enflure massive empêche tout appui et l'animal reste couché en permanence. La nécrose interdigitale apparaît précocement avec formation d'une plaie profonde.

Malgré un traitement antibiotique précoce, l'évolution peut rester incontrôlable. La mortalité atteint 10 à 20% des cas non traités rapidement. Le traitement nécessite une antibiothérapie prolongée de 6 à 10 jours. L'isolement immédiat des animaux atteints limite la propagation au reste du troupeau.

## *Prévention et mesures prophylactiques*

La prévention du panaris chez la vache repose sur la maîtrise de l'hygiène d'élevage :

- L'évitement des zones humides autour des points d'abreuvement constitue une priorité.
- L'installation de tapis le long des abreuvoirs limite le contact avec les surfaces souillées.
- Le drainage efficace des aires d'exercice réduit l'accumulation d'humidité.
- Le curage régulier des fumiers diminue la pression infectieuse environnementale.
- Les pédiluves préventifs avec solutions désinfectantes s'avèrent efficaces en période à risque.
- La supplémentation en zinc et vitamine A renforce la résistance cutanée.
- Le parage préventif des onglongs améliore la conformation podale et limite les traumatismes.