

Koorts- en ziekteregels – Praktisch schema

Leeftijd: 0 – 3 maanden

- + 38°C → ! Onmiddellijk ophalen

Leeftijd: 3 – 6 maanden

- + 38°C
 - Ouders verwittigen
 - Paracetamol geven
 - Opvolgen
 - Daling temperatuur Mag blijven (zonder extra symptomen)
 - Na 1u geen daling = ! ophalen
- + 38,5°C → ! Ophalen
- Volgende dag
 - Koortsvrij thuis = mag komen (zonder paracetamol)
 - Opnieuw + 38°C = ! naar huis + 24u koortsvrij

Leeftijd: 6 – 18 maanden

- + 38,5°C (zonder symptomen)
 - Ouders verwittigen
 - Paracetamol geven
 - Opvolgen
 - Daling temperatuur Mag blijven (zonder extra symptomen)
 - Na 1u geen daling = ! ophalen
- Extra symptoom → ! Ophalen
- + 39°C (zonder symptomen) → ! Onmiddellijk ophalen + 24u koortsvrij
- Volgende dag
 - Koortsvrij thuis = mag komen (zonder paracetamol)
 - Opnieuw + 38,5°C = ! ophalen + 24u koortsvrij

👶 Leeftijd: +18 maanden

- **38,5°C – 39°C (zonder symptomen)**
 - Ouders verwittigen
 - Paracetamol geven
 - Opvolgen
 - Daling temperatuur ✅ Mag blijven (zonder extra symptomen)
 - Na 1u geen daling = ❗ ophalen
- **+ 39°C → ❗ Ophalen**
- **Volgende dag**
 - Koortsvrij thuis = ✅ mag komen (zonder paracetamol)
 - Opnieuw + 38,5°C = ❗ ophalen + **24u koortsvrij**

🚒 Altijd naar huis (ook zonder koorts)

- **Diarree**
 - 2x na elkaar of waterig/stinkend binnen 24u → ❗ Naar huis
 - Terugkomen = diarreevrij
 - Opnieuw diarree = ❗ **24u diarreevrij**
- **Luizen**
 - ❗ Levend aanwezig = verwijderen + behandeling starten
- **Overdraagbare aandoeningen**
 - ❗ Bij twijfel = naar huis → (volg richtlijnen Kind en Gezin)
- **Onwel kind / veel zorg nodig**
 - ❗ Indien veiligheid groep in gevaar komt = naar huis