

ENVIRONMENTAL HAZARDS

HIGHLY TOXIC TO BEES AND OTHER POLLINATORS.

- Do not apply when bees are actively foraging.
- Apply during late evening, night, or early morning.
- Do not apply to blooming crops or weeds.

HIGHLY TOXIC TO AQUATIC ORGANISMS.

- Do not contaminate lakes, streams, ponds, or waterways.
- Do not apply directly to water.
- Do not clean equipment near water sources.

Observe buffer zones as specified by local regulations.

PRECAUTIONS & PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

- Wear chemical-resistant gloves, coveralls, waterproof boots, and a face shield or goggles.
- Wear a respirator (NIOSH-approved) during mixing/loading and in poorly ventilated areas.

Avoid contact with skin, eyes, and clothing.

Do not eat, drink, or smoke while handling the product.

Wash hands and exposed skin thoroughly with soap and water after handling.

RE-ENTRY PERIOD

Do not enter treated areas until sprays have dried. A minimum 12-hour Restricted Entry Interval (REI) is recommended unless otherwise specified by local regulation.

STORAGE

Store in a cool, dry, well-ventilated, locked area away from direct sunlight.

Keep original container tightly closed and clearly labelled.

Store away from food, feed, fertilizers, and seeds.

DISPOSAL

Triple-rinse empty container. Use rinse water in the spray tank.

Do not re-use empty container for any purpose.

Puncture and crush for disposal according to local, state, and federal regulations.

FIRST AID

Inhalation: Move person to fresh air. If breathing is difficult, seek medical attention.

Skin Contact: Remove contaminated clothing. Wash skin immediately with plenty of soap and water.

Eye Contact: Hold eyelids open and rinse slowly and gently with clean water for 15-20 minutes.

Seek medical attention.

Ingestion: Do NOT induce vomiting. Rinse mouth with water. Seek immediate medical attention

and show this container or label to the physician.

المخاطر البيئية

- شديد سمومة للنحل والملحقات الأخرى.
- لا يستخدم أثناء نشاط النحل في البحث عن الطعام.
- يُنصح في وقت متأخر من المساء، أو في الليل، أو في الصباح الباكر.
- لا يستخدم على المحاصيل المزهرة أو الأعشاب الضارة.

شديد سمومة للكائنات المائية.

- لا يؤثر النجيرات، أو الجاود، أو البرك، أو المجرى المائي.
- لا يستخدم مباشرة على الماء.
- لا تُنفخ المعدات بالقرب من مصادر المياه.
- التزم بالمناطق الازلية وفقاً للوائح المحلية.

الاحتياطات ومعدات الحماية الشخصية

- ارتد قفازات مقاومة للماء الكيميائية، وبدلات، واقية، وأخذية مقاومة للماء، واقية للوجه أو نظارات واقية.
- ارتد قفازات مقاومة للماء، واقية، وأخذية مقاومة للماء، واقية للوجه أو نظارات واقية.
- التهوية: تجنب ملامسة المنتج الجلد والعينين والملايين.

- لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء التعامل مع المنتج.
- اغسل يديك وجلد المكشوف جيداً بالماء والصابون بعد التعامل معه.

- فقط إزالة الغلوك
- لا تدخل المناطق المعالجة حتى يجف البخاخ. يُنصح بفترة دخول مهظورة لا تقل عن 12 ساعة (REI) ما لم تُنس.

الذخزين

- يُنصح في مكان بارد وجاف وجيد التهوية ويعمل بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- الاحتفاظ بالعبوة الأصلية مغلقة بالكام وملصقة عليها بوضوح.
- يُنصح بعيداً عن الطعام والأعلاف والأسمدة والبذور.

الخالص

- اشطف البيرة الفارغة ثلاث مرات. استخدم ماء الشطف في خزان الرش.
- لا تُنفخ المنتج على أي غرض من الأغراض.

- التبقي واستخْفَلَ النَّخَالَ مِنْهُ وَفَعَلَ الْمَوَالَةَ وَالْوَلَانَةَ وَالْفَدَرَ الْيَالَةَ.

الإسعافات الأولية

الاستنشاق: اغسل الشخص إلى مكان به هواء نقي، في حال صعوبة التنفس، اطلب العناية الطبية.

الملائكة: اغسل الملائكة الطيبة. اغسل العينين فوراً بكمية وفيرة من الصابون والماء.

ملائكة العينين: اغسل العينين فوراً واتسخها ببطء واتلف بالماء النظيف لمدة 15-20 دقيقة.

اطلب العناية الطبية.

الابتلاء: لا تُسبِّبُ التَّفَوُّقَ، اشطف فمك بالماء. اطلب العناية الطبية فوراً، وأظهر هذه العبوة أو الملصق للطبيب.

Man Date : Expiry Date: : Batch No: : Net Content: L : الموزع المحلي: الشركة الفنية الزراعية ذم

تاريخ الإنتاج : تاريخ التغشية : رقم التغشية : Net Content: : المحتوى الصافي: لتر : +971(3) 7669126

DELTA FORCE 2.5 EC

دلتا فورس 2.5 إيه سي

EC

هيئة المستحضر

محول قابل للاستحلاب Emulsifiable Concentrate

مبيد حشري من مجموعة البيرثرويد واسع الطيف

Broad-spectrum pyrethroid insecticide

التركيب

Active ingredient: Deltamethrin 2.5% (25g/L)

Inert Ingredients: 97.5% (w/v)

TOTAL: 100%

المادة الفعالة: دلتامثرين 2.5% (25 جرام/لتر)

المواد الحاملة : 97.5% (حجم/وزن)

المجموع: 100%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

رقم التسجيل في مؤسسة الإمارات للدواء

EDE Registration No

(.....)

Manufacturing Company

Agri-Veta LTD

Riebeckstraße 38 Leipzig
PLZ 04317 Deutschland, Germany
info@agri-veta.com



AGRI-VETA LTD



Origin: Germany

Local Distributor: TechnicalAgricultural Co. LLC

رقم التغشية: : Exp Date: : Net Content: L : الموزع المحلي: الشركة الفنية الزراعية ذم

تاريخ الإنتاج : تاريخ التغشية : رقم التغشية : Net Content: : المحتوى الصافي: لتر : +971(3) 7669126

DESCRIPTION

DELTA FORCE 2.5 EC is a broad-spectrum pyrethroid insecticide for agricultural use. It provides rapid knockdown and long-lasting residual control of a wide range of insect pests. It acts as a contact and stomach poison, targeting the insect's nervous system.

الوصف

دلتا فورس 2.5 إيه سي مبيد حشري بيرثرويد واسع الطيف، لل استخدام الزراعي. يوفر القضاء السريع والفعال على مجموعة واسعة من الأفات الحشرية، وينترك أثراً طويلاً المدى. يعمل كمبيد ملائم وسليم المعد، مستهدفاً الجهاز العصبي للحشرة.

DIRECTIONS FOR USE

Apply as a foliar spray when pests first appear or when damage is observed. Ensure thorough and uniform coverage of the crop canopy. Use higher water volumes for dense foliage.

طريقة الاستخدام: يُرش على الأراق عند ظهور الأفات أو عند ملاحظة أي ضرر. تأكيد من تغطية المحصول بالكامل وبشكل متساوٍ. استخدم كميات أكبر من الماء للحصول على أوراق كثيفة.

التعليمات

Crop	Target pests	Application rate	Water volume	PHI (days)
المحصول	الآفة	نسبة الاستخدام	كمية الماء	فتردة الأمان (أيام)
Apple	Codling moth, Caterpillars	300 ml/ 100 L of water عنة التفاح، البرقات	To ensure full coverage لضمان التغطية الكلية	7
Brassicas (Cabbage, Cauliflower, etc.)	Caterpillars – Aphids	300 ml/ha عنة البرقانات - المن	Minimum 600 L/ha لكل هكتار على 600 مل الأقل	7
Protected crops (Cucumber, Pepper, Tomato)	Aphids – Whitefly	70 ml/100 L of water المن - الذبابة البيضاء	To ensure full coverage لضمان التغطية الكلية	3
Cereals (Wheat, Barley)	Aphids	170-200 ml/ha المن	200 L/ha لكل هكتار	30
Peas & Beans	Pea moth – Aphids – Weevils	300 ml/ha البازلاء وال fascolosolia	200-400 L/ha لكل هكتار	7
Sugar Beet	Flea beetle – Aphids – خنفساء البرقايت - المن	250 ml/ha لكل هكتار	200-400 L/ha لكل هكتار	14
Potatoes	Aphids	300 ml/ha المن	200-400 L/ha لكل هكتار	7
Date Palm	Dubas bug – Lesser Date Moth	100 ml/100 L of water حرثاء دوبيلن - المحجورة	To ensure full coverage لضمان التغطية الكلية	14
Date Palm	Red Palm Weevil	100-125 ml/100 L of water سوسة النخيل الحمراء	To ensure full coverage لضمان التغطية الكلية	14
Grassland	Frit fly	250 ml/ha ذبابة فريت	200 L/ha لكل هكتار	14 (Do not graze)
Ornamentals	Caterpillars – Scale Insects	70 ml/ 100 L of water البرقانات - الحشرات الفشرية	To ensure full coverage لضمان التغطية الكلية	-

