

Instructions:

CROPS المحصول	PESTS الافة	TIMING OF APPLICATION وقت الاستخدام	DOSE kg/ha معدل الاستخدام كيلو جرام/هكتار
Wheat Barley القمح الشعير	March Fly, Root flies, Crane flies, نباب مارس، نباب الجند، نباب الكركي	at sowing وقت زرع البذرة	10 - 12
	Wireworms, European cockchafer/ May beetle، الدودة السلسلية، الخففاس الأوروبي، خففاس مليو	at sowing وقت زرع البذرة	12 - 16
Corn, sweet corn, sorghum الذرة، الذرة الرغبة	Wireworms, Cutworms, Corn rootworms, Root flies, Crane flies، الديدان السنبلة، بيدان القطع، بيدان جذور، الذرة، نباب الجذور، نباب الكركي	at sowing وقت زرع البذرة	12 - 16
Potato البطاطا	Wireworms, Cutworms، الديدان السنبلة، الديدان القطة	at sowing or transplanting وقت زرع البذرة او نقل الاشتال	12 - 16
Tomato, Eggplant, Pepper, Melon, Cucumber, Watermelon, Okra, Zucchini, Pumpkin طماطم، باذنجان، فلفل، شمام، خيار، بطيخ	Flea weevil, Spotted snake millipede, Centipedes, Flea beetle Carrot fly, Root flies, European cockchafer/ May beetle, Crane flies، سوسه الرايغث، دودة القطة، خففاس البراغيث، نباب الجند، نباب الجذور، خففاس مليو الأوروبي، نباب الكركي	at sowing or transplanting وقت زرع البذرة او نقل الاشتال	16 - 20
Cabbage, Cauliflower، ملفون، قرنيط		at sowing or transplanting وقت زرع البذرة او نقل الاشتال	16 - 20
Carrot, Turnip, Radish, Sweet potato، جزر، لفج، فجل، بطاطا حلوة	Wireworms, Cutworms, Flea weevil, Spotted snake millipede, Centipedes, Carrot fly, Root flies, European cockchafer/ May beetle, Crane flies، الديدان السنبلة، بيدان القطع، سوسه البراغيث، دودة القطة، المرقطة، نباب الجذور، نباب الجذور، الخففاس الأوروبي، نباب الكركي	at sowing or transplanting وقت زرع البذرة او نقل الاشتال	16 - 20
Floral and Ornamentals الزهار ونباتات الزينة	Wireworms, Cutworms, Spotted snake millipede, Centipedes, Flea beetle, European cockchafer/ May beetle, Crane flies، الديدان السنبلة، بيدان القطع، دودة الأفقي، المرقطة، خففاس البراغيث، خففاس مليو الأوروبي، نباب الكركي	at sowing or transplanting وقت زرع البذرة او نقل الاشتال	20 - 40

DIASTAR MAXI

دياستار ماكسي

Formulation Type هيئة المستحضر

محب Granule

Granular insecticide for the protection of numerous crops

مبيد حشري محبي

لحماية العديد من المحاصيل

Composition التركيب

Tefluthrin pure 0.5g
co-formulants up to 100g
المادة الفعالة تفلوثرين نقى 0.5 جرام
مواد معايدة حتى 100 جرام

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

رقم التسجيل في مؤسسة الإمارات للدواء
EDE Registration No
(AUD-AD-140-3056925)



Manufacturing Company:

DIACHEM S.p.A

المنشأ: إيطاليا



Local Distributor: Technical Agricultural Co.

الموزع المحلي: الشركة الفنية الزراعية

+971(3)7669126

المحتوى الصافي: جرام 5000

Man Date: تاريخ الإنتاج

Exp Date: تاريخ الانتهاء

Batch No: رقم التشغيلة

Warning:

- Children, birds and animals must be prevented from reaching the bait
- Hands and exposed areas of skin should be washed before eating
- The bait must be placed tightly in a way that prevents it from being pulled away-
- When using the product do not eat, drink or smoke

ارشادات الاسعافات الاولية:

- في حالة ملامسة العينين قد يغسل العينين بالماء واستشارة الطبيب
في حالة ملامسة الجلد قد يغسل الجلد بالماء والصابون
في حالة البلع لا تقوم بمحاولة التقيؤ واتصل فوراً بالطبيب واحضر له شرة السلامة
في حالة الاستنشاق ينفث المصاص الى الهواءطلق

FIRST AID INSTRUCTIONS

- If in Eyes: Wash immediately with running water and consult a doctor
If on skin: Should be washed off with soap and water
If swallowed, DO NOT induce vomiting and immediately contact a doctor and show him the MSDS.
If inhaled, Remove the patient to fresh air

لتخزين: تخزن المادة في عبوتها الأصلية المغلقة في مكان جاف وجيد التهوية بعيداً عن الطعام
التخلص من العبوات : يتم التخلص من العبوات عن طريق تسليمها لمرافق التخلص من الفضلات الخطرة

STORAGE AND DISPOSAL:

Stored in their original packaging material enclosed in a dry and well-ventilated and away from food & be disposed of containers delivered by the Canter for the disposal of hazardous waste

الضمائن: تضمن الشركة المنتجة ثبات الموصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد وسلامته في عبوته
الأصلية في التخزين العادي طيلة فترة صلاحيته تحت ظروف دولة الإمارات العربية المتحدة

WARRANTY STATEMENT: The manufacturer to ensure the stability of the chemical and physical specifications for this pesticide and integrity of the container in the normal storage for the duration of its validity under the conditions of the United Arab Emirates

HOW TO USE: DIASTAR MAXI should be applied along the row at the time of sowing or transplanting (where specified) with properly calibrated micro granulators. In the case of floral and ornamental crops, it should be applied in the open field and then incorporated into the soil with a light harrowing (3-5 cm).

يرُشّن دياستار ماكسي على طول الخط عند الزراعة أو النقل (عند الحاجة) باستخدام جببات دقة معايرة. بالنسبة للمحاصيل الزهرية والزينة، يُرشّن في الحقل المكشوف، ثم يُدمج في التربة بخراث خفيف (3-5 سم).

FEATURES

DIASTAR MAXI is a pyrethroid insecticide that is particularly active against beetles, Diptera, lepidoptera and myriapods that spend part of their life cycle in the soil. The product acts by contact and, in the vapor phase, has a strong repellent activity that increases its protective effectiveness.

DIASTAR MAXI is active at low doses and thanks to its mechanism of action, which is different from organo-phosphorus and carbamate products, it can also be suitable for technical recommendations that require rotation in the use of geodisinfectants. Thanks to its special formulation, the product stimulates the germination process and facilitates the overcoming of transplant stress

الخصائص:

دياستار ماكسي مبيد حشري بيرثروبيد فعال بشكل خاص ضد الخنافس، والديدان، وقشريات الأجنحة، والعديدات الأرجل التي تفضي جزءاً من دورة حياتها في التربة. يعمل المنتج عن

طريق التلامس، وفي طور البارد، ينتفع بتأثير طارد قوي يزيد من فعاليته الوافية.

دياستار ماكسي فعال بجرعات منخفضة، ويعمل عليه أية عملة، التي تختلف عن منتجات الفوسفور العضوي والكاربامات، يمكن استخدامه أيضاً للتوصيات الفنية التي تتطلب التناوب في استخدام المبيدات المشربية الأرضية.

يُحصل ترتيبته الخاصة، يغفر المنتج عملية الإنابات ويسهل التغلب على إجهاد عملية الزرع.