tradecorp® Fe

Premium Iron (Fe) EDTA chelate to prevent & correct Iron deficiency, 100% soluble microgranule

تريد كورب Fe

حديد مميز وفاخر(Fe) والمخلّب بواسطة EDTA لمنع ظهور وتصحيح وعلاج نقص الحديد ، 100% حبيبات دقيقة قابلة للذوبان في الماء

Tradecorp Fe is a premium 100% soluble microgranule of Iron EDTA, manufactured by the European chelate experts – Tradecorp, for the prevention and correction of Iron deficiency in all crops Iron is essential for chlorophyll synthesis. as well as Nitrate and Sulphate reduction and is a component of many enzymes and pigments. Iron is a very reactive nutrient and is easily immobilized in soil or tank mixes, thus protection of the Iron by chelation. such as with EDTA, is essential to guarantee the iron reaches the plant.

Tradecorp Fe is suitable for foliar application, as well as for use in a wide range of soils from pH range 4 – 7.

The specific advantages of Tradecorp Fe are: EDTA chelated micronutrients reduce tank mix incompatibilities and guarantee the absence of competition during uptake. 100% soluble microgranule (WG) for rapid & Instantaneous solubility without foaming, keeping tanks clean.

~ Suitable for use in foliar, drip. sprinkler, direct soil, substrate & hydroponic applications. Compatible with most-commonly used fertilizers and agrochemicals, High efficiency at low dose rates.

DOSAGE AND METHOD OF USE General Dosage:

0.5 - 1.5 kg/ha, 2 - 4 applications,14 -21 day Intervals, before or as soon as symptoms appear, or as part of a micro-nutrient general management program. The bulk of Iron should be applied prior to commencement of flowering.

- Vegetables: 05- 1.0 kg /ha (75 -100 g /100 L), 2-3 applications. 14 day intervals, from early in the crop cycle once foliage is sufficient. In continuous flowering crops Such as tomato and chili, continue to apply every 14 - 28 days.
- Cereals, Legumes: 0.75- 1.5 kg /ha, 2-3 applications at tillering, early stem elongation and flag leaf emergence in cereals (BBCH21,31&39),from 5 leaf stage until before flower buds visible in legumes such as soy bean (BCH 15 51),- and side shoots, rosette and mid stem elongation in OSR (BACH 21, 31, 33)
- Orchards & Vines: 0.75- 1.5 kg /ha (50- 100 g /100 L), 2-4 applications,14-21-day intervals, 2-3 applications before flowering and 1 once the fruit has set.
- Potatoes, Roots & Tubers: 0.75 - 1.0 kg/ ha, 3 - 4 applications, 7 - 10 day intervals, once stems reach 10 cm, or 6 leaves Stage in onion and carrot. Use high water volumes (e.g. 500 L /ha).
- Ornamentals: 0.2 - 0.5 kg/h (10- 25 g /100 L), 2- 5 applications, 7- 10 days intervals, during the vegetative stage.

Spray onto dry foliage using high water volumes and foresee 3 - 4 hours without rain for optimal penetration.

Do not apply by foliar spray during flowering in pomme fruit,

DIRECTIONS FOR USE

Do not apply foliar EDTA chelates to fruit crops at >0.1% concentration (100 g /100L water). This is cumulative.

If you mix two different EDTA

Chelate products you must not exceed 100 g /100L for the two products is maximum dosage will be 50 g of each product to give combined 100g /100L water. Do not apply foliar EDTA chelates to broad acre crops at >1% concentration (1 kg /100L water).

The same warning about cumulative dosage applies when mixing two different EDTA products as for fruit crops above.

Certain stone fruit vary In their sensitivity to foliar chelates it is recommended to carry out a test before a full application.

Do not apply during flowering or during fruit colour change.

add product to water while agitating and continue agitation until granules have fully dissolved

COMPATIBILITY

product is compatible with most commonly used fertilisers and agrochemicals. It is recommended to carry out a test before preparing any mixture and to consult technically authorized personnel,

disclaimer: The recommendations and information provided comes from several trials and Studies that have been undertaken, however, During the application of the product several factors out of our control may take place (tank mixes, application, climatic conditions, etc.).

Any commendation must serve as a guide and be adapted to focal conditions.

WARNINGS, HANDLING AND STORAGE

Keep out of reach of children. Do not eat, drink or smoke when using this product. Store in a fresh, dry place and keep away from extreme temperatures. Keep only in original container. Use the product according to the instructions in this label. In case of doubt, please contact authorized technicians. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.

Disclaimer: The recommendations and information provided comes from several trials and studies that have been undertaken, however, during the application of the product several factors out of our control may take place (tank mixes, application, climatic conditions, etc.). Any recommendation must serve as a guide and be adapted to local conditions.

طريقة الاستخدام والجرعات

الجرعة العامة: 0.5- 1.5 كجم/ هكتار 2 - 4 مرا ت، خلال فترا ت متفاوتة مابين 14-21 قبل ظهور أعراض النقص أو بمجرد ظهورها ، أو كجزء من برنامج التسميد . يجب استخدام الجزء الأكبر من الحديد قبل بدء الإزهار.

-الخضراوات: 05 - 1.0 كجم/ هكتار (75-100 جم / 100 لتر) ، 2-3 معاملات بفارق زمنى 14 يوم ، من وقت مبكر من دورة المحاصيل بمجرد أن تكون أوراق النبات كافية. وفي المحاصيل المزهرة المستمرة مثل الطماطم و الفلفل يستمر الإستخدام كل 14 - 28 يومًا.

-الحبوب والبقوليات: 0.75- 1.5كجم/ هكتار، 2-3مرات عند الحراثة ،و استطالة الساق المبكرة وظهور الأوراق في الحبوب (BBCH-21، 31، 39) من مرحلة 5 أوراق حتى ما قبل ظهور براعم الزهور في البقوليات مثل فول الصويا (15-51كجم) ، والبراعم الجانبية واستطالة منتصف الساق في النفت(OSR (BACH 21, 31, 33

-البساتين والكروم: 0.75 - 1.5 كجم / هكتار (50-100 جم / 100 لتر) ، 2-4 معاملات على فترات 14-21يومًا ، 2-3 معاملات قبل التزهير ومعاملة بمجرد ظهور الثمار.

-البطاطس والجذور والدرنات: 0.75 - 1.0كجم/ هكتار ، 3-4مرات ،كل 7- 10أيام ، عند وصول الساق إلى 10 سم ، أو في مرحلة ظهور 6 أوراق في البصل والجزر.

استخدم كميات كبيرة من المياه (على سبيل المثال 500 لتر / هكتار).

-نباتات الزينة: 0.2 - 0.5 كجم/ هكتار (10-25جم / 100لتر) ، 2- 5مرات كل 7- 10أيام ، خلال مرحلة النبات .

قم بالرش على أوراق الشجر الجافة باستخدام كميات كبيرة من الماء مع توقع عدم هطول المطر لمدة 3-4 ساعات لتحقيق الاختراق الأمثل.

لا تستخدم الرش الورقي أثناء الإزهار في فاكهة التفاح ،

تعليمات الاستخدام

لا تستخدم مخلّب EDTA الورقي على محاصيل الفاكهة بتركيز> 0.1٪ (100 جم / 100 لتر ماء). هذا تراكمي.

إذا قمت بخلط نوعين مختلفين من EDTA المنتجات المخلبية يجب ألا تتجاوز 100مم / 100لتر للمنتجين تكون الجرعة القصوى 50 جم من كل منتج لإعطاء 100 جم /100 لتر ماء. لا تستخدم مخلّبEDTA الورقي على المحاصيل ذات مساحة قدان واسعة بتركيز> 1٪ (1 كجم / 100 لتر ماء).

ينطبق نفس التحذير حول الجرعة التراكمية عند خلط منتجين مختلفين من EDTA كما هو الحال مع محاصيل الفاكهة أعلاه.

تختلف بعض الثمار ذات النواة في حساسيتها تجاه المخلبات الورقية ، يوصى بإجراء اختبار قبل الاستخدام الكامل.

لا يتستخدم أثناء الإزهار أو أثناء تغير لون الفاكهة .

أضف المنتج إلى الماءأ أثناء التحريك واستمر في التقليب حتى تذوب الحبيبات تمامًا

التوافق

المنتج متوافق مع الأسمدة والكيماويات الزراعية الأكثر استخدامًا. يوصى بإجراء اختبار قبل تحضير أي خليط واستشارة الفنيين المعتمدين ، إخلاء المسؤولية: تأتي التوصيات والمعلومات المقدمة من العديد من التجارب والدراسات التي تم إجراؤها ، ومع ذلك ، أثناء تطبيق المنتج ، قد تحدث عدة عوامل خارجة عن سيطرتك (خلطات الخزان ، والتطبيق ، والظروف المناخية ، وما إلى ذلك).

يجب أن يكون أي شاه بمثابة دليل وأن يتم تكييفه مع الظروف المحلية.

Tradecorp Fe عبارة عن حبيبات دقيقة عالية الجودة قابلة للذوبان بنسبة 100٪ من الحديد EDTA ، تم تصنيعها بواسطة خبراء المخلبيين الأوروبيين ، من أجل الوقاية من نقص الحديد وتصحيحه في جميع المحاصيل الحديد ضروري لتخليق الكلوروفيل مثل النترات والاختزال والكربونات وهو أحد مكونات العديد من الإنزيمات والصبغات. الحديد مادة مغذية شديدة التفاعل ويمكن تثبيتها بسهولة في التربة أو مخاليط الخزان ، لذلك فإن حماية الحديد عن طريق الاستخلاب هو أمر أساسي لضمان وصول الحديد إلى النبات.

Tradecorp Fe مناسب للرش على الأوراق ، وكذلك للاستخدام في مجموعة واسعة من أنواع التربة التي تتراوح درجة حموضتها ما بين 4 – 7.

المزايا المحددة لـ Tradecorp Fe هي: - تقلل العناصر الصغرى المخلبية بـ EDTA من عدم توافق مزيج الخزان وتضمن عدم وجود منافسة أثناء الامتصاص.

100٪ حبيبات دقيقة قابلة للذوبان (WG) للذوبان السريع والفوري بدون رغوة ، والحفاظ على الخزانات نظيفة.

-مناسبة للاستخدام في الأوراق ، بالتنقيط الرش ، التربة المباشرة ، الركيزة وتطبيقات الزراعة المائية.

- متوافق مع الأسمدة والكيماويات الزراعية الأكثر استخدامًا ، - كفاءة عالية بمعدلات جرعات منخفضة.

التخزين والتداول والتخزين: يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. لا تتناول الطعام والشراب أو التدخين اثناء استخدام هذا المنتج وتخزينها في مكان جاف جيد التهوية كما يرجى الاحتفاظ به بعيدا عن درجات الحرارة القصرى. يحفظ فقط في العبوة الأصلية. يستخدم المنتج وفقا للتعليمات الموضحه على هذا الملصق. في حالة الشك، يرجى الاتصال بالفنيين المتخصصين.يستخدم فقط عند الحاجة. يجب عدم تجاوز الجرعات المقررة.

تحذير: التوصيات والمعلومات الموجودة ناتج الحصول عليها من خلال عدة تجارب ودراسات. على أي حال توجد بعض العوامل التى تكون خارج السيطرة والتى يجب أخذها فى الاعتبار مثل (التلك الذي تتم فيه عملية الخلط ، الظروف المناخية الخ ...).

أي توصيات تكون استرشادية ويجب تكييفها مع ظروف الاستخدام المحلية

EC FERTILIZER

Guaranteed contents: التركيب المضمون

Iron (Fe) soluble in water and chelated by EDTA: 13.2% w/w

حديد (Fe) مخلبي بواسطة EDTA ١٣,٢% وزن/وزن

EDTA pH stability range: 4–7

يحفظ بثبات التخليب بين مدى PH ٤ - ٧

Made in Spain

صنع في اسبانيا

رقم التسجيل فى وزارة التغير المناخي والبيئة

Registration NO. IN MOCCAE

DXB-APH-34-2291448

NET WEIGHT 1 Kg الوزن الصافي ١ كغم

الوكيل بدولة الإمارات العربية المتحدة:

الشركة الفنية الزراعية. ذ.م.م.

مدينة العين/ هاتف : ٠٣/٧٦٦٩١٢٦

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV

ISO 9001

ISO 14001

tradecorp nutri-performance

Manufacturing date: تاريخ الإنتاج :

Lot number: رقم التشغيلة :

Expiry date: 4 years after the manufacturing date. تاريخ الصلاحية : ٤ سنوات من تاريخ الانتاج.