



# KAMAGRA SPAIN



**Kamagra Oral Jelly 100, un gel para la DISFUNCIÓN ERECTIL** es un tratamiento popular y eficaz para los hombres con esta enfermedad. A diferencia de las tabletas ingeribles, la gelatina puede sacarse de la cucharadita o directamente en la boca y tragarse cómodamente. Kamagra Oral Jelly se fabrica clínicamente en las instalaciones limpias de Ajanta Pharma.

El ingrediente activo de Kamagra Oral Jelly 100 mg es CITRATO DE SILDENAFIL. Pertenece a la familia de vasodilatadores PDE-5. Estos medicamentos actúan dilatando los vasos sanguíneos del cuerpo, especialmente alrededor de las áreas genitales. Esto, a su vez, permite un flujo sanguíneo más masivo para permitir una erección. Kamagra Jelly no es un afrodisíaco y se requerirá estimulación para lograr una erección.

Kamagra Oral Jelly viene en una variedad de sabores, como:

- chocolate
- plátano
- naranja
- mango
- fresa
- piña
- vainilla
- 

En cada pedido se enviará una selección de diferentes sabores. Desafortunadamente, no podemos agregar solo un sabor específico.



# KAMAGRA SPAIN

## Beneficios

La jalea oral reduce la necesidad de tomar comprimidos en hombres que no pueden o no quieren tragar comprimidos. Después de la inserción en la boca, el gel se disuelve automáticamente y pasa por la garganta sin reacciones desagradables.

Los beneficios de Kamagra Oral Jelly incluyen:

- fácil de tragar gelatina
- absorción rápida en el cuerpo
- tiempos de respuesta más rápidos
- tiempo de tratamiento efectivo 4-6 horas
- alta resistencia

## Cómo funciona

*El citrato de sildenafil* bloquea la acción de una enzima conocida como fosfodiesterasa tipo 5 específica de cGMP (PDE-5). Esta enzima descompone cGMP, una sustancia que induce la relajación de los músculos lisos. El bloqueo de PDE-5 significa un aumento de los niveles de cGMP dentro de los músculos lisos, lo que promueve la relajación muscular y la vasodilatación (un ensanchamiento de los vasos sanguíneos).

Se encuentran niveles altos de PDE-5 en el pene, los pulmones y la retina. La PDE-5 también se encuentra en todo el cuerpo dentro de las células del músculo liso de los vasos sanguíneos y los músculos.

*El citrato de sildenafil* pertenece a la clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la PDE-5. *El citrato de sildenafil* aumenta el flujo sanguíneo al pene después de la estimulación sexual. Lo hace bloqueando la enzima responsable de la degradación de cGMP. El cGMP es una sustancia que relaja y ensancha los vasos sanguíneos y las células del músculo liso. Esto permite que los hombres mantengan una erección lo suficientemente fuerte como para tener relaciones sexuales.

*El citrato de sildenafil* solo actúa después de la estimulación sexual. Actúa entre 30 y 60 minutos, pero se puede tomar hasta cuatro horas antes de la actividad sexual.

*El citrato de sildenafil* se usa para tratar la disfunción eréctil (DE) y para reducir la presión arterial en la hipertensión arterial pulmonar (HAP). Se toma cuando es necesario para la disfunción eréctil y a diario para la HAP. Los principales efectos secundarios son dolor de cabeza, malestar estomacal y enrojecimiento.

Kamagra Oral Jelly (Gel) 100 mg puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que funciona



# KAMAGRA SPAIN

Kamagra Oral Jelly (Gel) 100 mg y causar efectos secundarios. Kamagra Oral Jelly (Gel) 100 mg no lo protege a usted ni a su pareja de contraer enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH, el virus que causa el SIDA.

## Efectos secundarios

Junto con los efectos necesarios, Kamagra Oral Jelly 100 mg puede causar algunos efectos secundarios indeseables. Aunque no todos pueden ocurrir, pueden requerir atención médica.

Los efectos secundarios más comunes de Kamagra Oral Jelly son:

- dolor de cabeza
- enrojecimiento
- congestión o secreción nasales
- náusea
- mareo
- sarpullido
- otros

## Cómo tomar este medicamento

Para aprovechar al máximo su tratamiento, lea atentamente lo siguiente:

- La dosis segura indicada de Kamagra en 24 horas es de 100 mg (1 sobre)
- este medicamento surtirá efecto 20 minutos después de su uso
- la duración efectiva del tratamiento es de 4-6 horas
- Evite los alimentos grandes o grasos cerca de la hora en que planea tomar el medicamento
- el alcohol reducirá la eficacia de este medicamento

## Contraindicaciones

Los pacientes que toman los siguientes tipos de medicamentos NO deben tomar Kamagra Oral Jelly (Gel) 100 mg:

- medicamentos con nitratos (medicamentos con nitroglicerina)
- medicamentos con nitroprusiato
- estimuladores de guanilato ciclasa como Adempas (riociguat)
- alfabloqueantes (a veces recetados para problemas de próstata o presión arterial alta)
- inhibidores de la proteasa del VIH
- algunos tipos de medicamentos antimicóticos orales
- otros medicamentos que tratan la presión arterial alta



# KAMAGRA SPAIN

- otros medicamentos o tratamientos para la disfunción eréctil
- nitrato de amilo (conocido de forma recreativa como poppers)
- medicamentos para receptores de donantes de órganos
- medicamentos antimicóticos azólicos que se toman por vía oral (las cremas tópicas para el tratamiento de candida / aftas son seguras)