

UNE RÉFÉRENCE À TOUTE ÉPREUVE



INDAPAMIDE
Indapamide 1,5 mg
BEKER
LP


INDAPAMIDE
Indapamide 1,5 mg
BEKER
LP

EFFICACITÉ HYPERTENSIVE COUVRANT LES 24 HEURES

DIMINUTION DE L'HYPERTROPHIE VENTRICULAIRE GAUCHE

BONNE TOLÉRANCE GÉNÉRAL

Respect du métabolisme lipidique et glucidique(*)



Indications thérapeutiques

Hypertension artérielle essentiel

Posologie

Une prise le matin



(*): Ames R.P :indapamide versus thiazides. Am j Hypertension 1995;8(4parts2):77A

FORME ET PRESENTATION Indapamide BEKER® LP 1.5mg : comprimé pelliculé à libération prolongée, boîte de 30 ou 90 comprimés

COMPOSITION Chaque comprimé pelliculé contient : Indapamide 1.5 mg
Excipients : Lactose, hypromellose, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, dioxyde de titane, polydextrose, talc, maltodextrine, triglycérides à chaîne moyenne, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge. **Excipient à effet notoire : Lactose 120.9mg/Cp**

CLASSE THERAPEUTIQUE Diurétique du segment cortical de dilution.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle. **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION Posologie** Un comprimé par 24 heures, de préférence le matin, compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes **Mode et voie d'administration** Voie orale. Le comprimé doit être avalé entier avec de l'eau, et ne doit pas être croqué

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION DE VOTRE MEDECIN. CONTRE-INDICATIONS Ne pas prendre **Indapamide BEKER® LP 1.5mg** dans les cas suivants : Allergie connue à ce médicament ou aux sulfamides Insuffisance rénale Encéphalopathie hépatique ou insuffisance hépatique sévère Hypokaliémie (baisse anormale du taux de potassium dans le sang) EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. **MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI Mises en garde spéciales** L'Administration du produit doit être interrompue en cas d'atteinte hépatique. En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares) **Précautions d'emploi** Utiliser ce médicament avec précaution en cas de : Trouble de l'équilibre hydroélectrolytique Diabète. Goutte. Troubles rénaux. Troubles hépatiques et problèmes du rythme cardiaque. Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens de laboratoire pour la surveillance de votre traitement. L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce produit contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage. EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. **INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS** L'association de l'**Indapamide BEKER® LP 1.5mg** est déconseillée avec : le lithium (utilisé dans le traitement de la dépression), le diazoxide (utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle), certains médicaments modifiant l'ECG ou provoquant des troubles sévères du rythme cardiaque. Des précautions doivent être prises en cas d'association aux : anti-inflammatoires non stéroïdiens (ex : ibuprofène) ou l'aspirine à forte dose (≥ 3 g/jour) ; médicaments pouvant provoquer une perte excessive de potassium dans le sang, tel que l'amphotéricine B (intraveineuse), corticoïdes (voie générale) ou certains laxatifs. baclofène (traitement de la raideur musculaire survenant notamment lors de scléroses multiples) ;

traitement de l'insuffisance cardiaque, et certains troubles du rythme cardiaque) les diurétique épargneurs de potassium : amiloride, spironolactone, triamtérène ; les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (utilisés dans le traitement de l'hypertension ou de l'insuffisance cardiaque) ; les antiarythmiques : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, Brétylium, sotalol ; la metformine (utilisée dans le traitement du diabète) ; les produits de contraste iodés ; certains neuroleptiques ; les sels de calcium ; la ciclosporine (immunosuppresseur). AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, **GROSSESSE ET ALLAITEMENT Grossesse** : L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse ; en effet les diurétiques peuvent entraîner une ischémie fœtoplacentaire, avec un risque d'hypotrophie fœtale **Allaitement** : L'allaitement est déconseillé (passage dans le lait maternel) D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT. **CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES** Des réactions individuelles en relation avec une baisse de pression artérielle peuvent survenir chez certains patients. Par conséquent l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines peut être diminuée. **EFFETS INDESIRABLES** Comme tous les médicaments **Indapamide BEKER® LP**, est susceptible d'induire des effets indésirables : Sensation de fatigue (Asthénie), maux de tête, fourmillements des extrémités, crampes, Sensation de vertige lors du passage de la position couchée à la position debout. Risque de déshydratation majoré chez les personnes âgées et chez les insuffisants cardiaques. Nausées, constipation, bouche sèche. Il est possible que se produisent des variations des paramètres sanguins, notamment une perte excessive de potassium plus particulièrement chez les personnes âgées ou dénutries et une baisse du taux de sodium dans le sang ; Manifestation de type allergique, rare cas d'éruption cutanée. SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE. **SURDOSAGE** Si vous avez pris plus d'**Indapamide BEKER® LP** que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. **OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES** Si vous oubliez de prendre **Indapamide BEKER® LP** ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre, continuez votre traitement le lendemain au rythme d'un comprimé par jour. **CONSERVATION** : A conserver dans l'emballage externe d'origine à une température ne dépassant pas 25C° Tenir hors de la vue et la portée des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte. **Liste II DE n°:** **Détenteur de la DE :** Laboratoires BEKER Cité Aissat Idir, Dar El Beida 16100, Alger **Fabricant/ Conditionneur :** Laboratoires BEKER, Algérie ZA, extension Dar El Beida 16100, Alger

