

ชนิดพืช	ระยะเวลาเติบโตของพืช	อัตราการใช้	ระยะเวลาการพ่น
*ข้าวทุกชนิด ข้าวสาลี ข้าวบาเล่	ระยะต้นกล้า ระยะแตกกอ ช่วงตั้งท้อง ช่วงสร้างเมล็ด และน้ำหนักร	1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร	ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน
*อ้อย *ยางพารา *ปาล์ม	อายุไม่เกิน 3 เดือน อายุ 3 เดือนขึ้นไป	1 ซองต่อน้ำ 120 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร	ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน
*ข้าวโพด	อายุไม่เกิน 1 เดือน อายุเกิน 1 เดือนขึ้นไป	1 ซองต่อน้ำ 120 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร	ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน
*มันสำปะหลัง	*แช่ท่อนพันธุ์* อายุไม่ถึง 1 เดือน อายุ 1 เดือนขึ้นไป อายุ 3 เดือนขึ้นไป อายุ 5-6 เดือนขึ้นไป	1 ซองต่อน้ำ 100 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 120 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร	แช่ไว้ 15-30 นาที ฉีดพ่นทุก 15-20 วัน ระเบิดหัวมัน สร้างแป้ง
ไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง มังคุด ทุเรียน ลำไย ส้ม เงาะ ลิ้นจี่ ลองกอง มะนาว มะพร้าว ฝรั่ง น้อยหน่า ละมุด ขนุน สับปะรด ส้มโอ เป็นต้น	อายุไม่เกิน 3เดือน อายุ 3 เดือนขึ้นไป *ราดโคน*	1 ซองต่อน้ำ 120 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 60 ลิตร ราดต้นละ 2-3 ลิตร	ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน ราดโคนทุก 15-30 วัน ขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม
พืชผักต่างๆ ผักกินใบ เช่น พริก หอม กระเทียม ผักชี กระเทียม กวางตุ้ง กระเจี๊ยบ มะเขือ กะหล่ำดอกกะหล่ำ ปลี เป็นต้น	อายุไม่ถึง 1เดือน อายุ 1 เดือน ขึ้นไป	1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร หรือ 1 ซองต่อน้ำ 300-400 ลิตร	ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ฉีดพ่นทุก 4 วัน
พืชล้มลุก พืชตระกูลถั่วเลื้อย เช่น ถั่ว งา พักเขี้ยว พักทอง มะละ แตงกวา แตงโม แคนตาลูป ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ มะละกอ ถั่วฝักยาว อื่นๆ	อายุไม่ถึง 1เดือน อายุ 1 เดือน ขึ้นไป	1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 120 ลิตร หรือ 1 ซองต่อน้ำ 300-400 ลิตร	ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน ฉีดพ่นทุก 4 วัน
ไม้ดอก/ไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ ดาวเรือง กุหลาบ มะลิ อื่นๆ	อายุไม่ถึง 1 เดือน อายุ 1 เดือนขึ้นไป	1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 180 ลิตร	ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน
พืชลงหัว เช่น มันฝรั่ง มันเทศ มันแกว เผือก อื่นๆ	อายุไม่ถึง 1 เดือน อายุ 1 เดือนขึ้นไป	1 ซองต่อน้ำ 200 ลิตร 1 ซองต่อน้ำ 180 ลิตร	ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน
ปรับสภาพดิน		1 ซองต่อน้ำ 100 ลิตร	พ่นช่วงเตรียมดินก่อนปลูก

ฉีดพ่นเป็นละอองฝอยช่วงเช้าที่พืชเปิดปากใบ เวลา 5.00-10.00 น. ผสมสารอื่นๆได้ (ยกเว้นยาฆ่าหญ้า)”

ผสมสีทองกับน้ำที่เราดื่ม 1 ลิตร ก่อน 1 คืน หรือ 30 นาที ก่อนนำไปใช้ตามอัตราส่วนของพืชแต่ละชนิด

*ข้อควรระวัง เมื่อผสมน้ำแล้วควรเก็บไว้ในที่ร่ม ห้ามร้อน ห้ามตากแดด