

CRYPTOLEPIS ☒ S

WWW.CUEVAATALAYA.COM



Cryptolepis sanguinolenta maakt onderdeel uit van het Buhner Lyme protocol. Hij veroorzaakt volledige uitroeiing van de bacterie, terwijl de antibiotica doxycycline en cefuroxim en andere actieve kruiden dat niet deden. Dit extract wordt ook gebruikt voor de behandeling van malaria en de door teken overgedragen infectie Babesia, veroorzaakt door een malaria-achtige parasiet. (Onderzoek van de Johns Hopkins universiteit en collega's van het Center for Functional Medicine en de FOCUS Health Group)

Verder vertoonden naast Cryptolepis sanguinolenta, Polygonum cuspidatum (Japanse duizendknoop) een sterke activiteit tegen zowel de groeiende vorm van de Borrelia bacterie als tegen de niet groeiende vorm van de bacterie.

Toepassingen en eigenschappen

- Tegen Malaria (kan ook preventief genomen worden als men bijvoorbeeld op reis gaat naar Afrika)
- preventie Lyme & Babesia ● Bloedvergiftiging ● algemene vergiftiging
- stabiliseert de bloeddruk, bij een té hoge of té lage bloeddruk
- antibacterieel ● antischimmel ● antiparasitair ● antiviraal
- koortswerend ● ziekte van Parkinson ● maag-en darminfecties
- leverontsteking ● algemene vergiftiging (bij bv.slangenbeten)
- infecties aan de bovenste luchtwegen
- bloedverdunnend ● infecties urinewegen ● fungeert als neurotransmitter ● Geelzucht ● MRSA ● verbetert de doorbloeding

RANKER

Verschillende studies betreffende cryptolepis en zijn belangrijkste alkaloïde tonen een zeer krachtige cytotoxische activiteit aan en er zijn meerdere werkingsmechanismen gesuggereerd. Recent opkomend bewijs suggereert ook dat het cytotoxiciteitsmechanisme nauw verband kan houden met de ontstekingsremmende werking.

MET LIEFDE VOOR JOU

Dit informatieblad wordt vertrouwelijk gegeven en heeft als enig doel om zoveel mogelijk ondersteunend te zijn bij het verantwoord gebruik van deze tinctuur.

Dosering en gebruik

Standaard dosering 3x 20 druppels
Intensieve kuur (Buhner protocol)
opbouwen tot 3x 30-60 druppels.
Of volgens voorschrift arts.

Intensieve kuur max 60 dagen, dan 2 weken pauze.

Bij acute infectie of virus ieder uur 10 druppels tot verbetering.

Begin de kuur altijd met een lage dosis. Hoe ernstiger de symptomen, hoe lager de startdosering. Dit is om te voorkomen dat er in één keer erg veel afvalstoffen vrijkomen. Omdat er altijd afvalstoffen vrij komen (ook bij lage dosering) is het advies om gedurende de kuur veel (water) te drinken

Geen contra indicaties bekend en mag gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoeding.