

FICHE D'INFORMATION

Les fractures (chien & chat)

QU'EST-CE QU'UNE FRACTURE ?

Une fracture est une rupture de l'os. Elle résulte le plus souvent d'un traumatisme important : accident de la route, chute (balcon, terrasse...), morsure ou bagarre. Plus rarement, une fracture dite « pathologique » survient sur un os déjà fragilisé par une maladie (tumeur...).

Le type de fracture (simple, déplacée, multi-fragmentaire, ou « ouverte » lorsque la peau est lésée), l'os concerné, l'espèce et le poids de l'animal orientent le choix du traitement.

SIGNES À RECONNAÎTRE

Une fracture est très douloureuse : votre animal ne pose généralement plus sa patte (boiterie franche), et des craquements sont parfois perçus. Le traumatisme peut aussi avoir provoqué des lésions internes (hémorragie, atteinte des poumons) parfois plus graves que la fracture elle-même.

Consultez sans attendre : un bilan recherche d'éventuelles lésions vitales avant de traiter l'os.

IMAGERIE



Fracture du radius et de l'ulna (radiographie).

LE BILAN ET LA STABILISATION

On vérifie d'abord les fonctions vitales : radiographies du thorax, échographie de l'abdomen, parfois bilan sanguin, en plus des radiographies du membre. Si besoin, un traitement de réanimation est mis en route et l'animal est surveillé 24 à 48 h — période durant laquelle des complications peuvent apparaître.


LE TRAITEMENT

Une fois l'animal stabilisé, on répare la fracture. Selon le cas : immobilisation par une résine (fractures simples ou incomplètes), broches, plaques et vis, montages combinant plusieurs implants, ou fixateur externe (broches reliées à l'extérieur de la patte, utile pour les fractures ouvertes).


Le principe est toujours de réaligner et d'immobiliser les fragments pour qu'ils se ressoldent. La consolidation prend en moyenne 6 à 8 semaines ; en attendant, ce sont les implants qui assurent la solidité de la patte — car on ne peut pas demander à l'animal de ne

pas s'appuyer dessus.

EXEMPLES DE MONTAGES



Fracture de l'humérus par balle : fixateur externe Tie In



Fracture du bassin et du femur traitées par plaque et broches

L'INTERVENTION & L'HOSPITALISATION

L'anesthésie est réalisée avec un monitoring complet des fonctions cardio-respiratoires. La patte est tondue largement et désinfectée. On réaligne les fragments, puis des radiographies de contrôle vérifient la bonne « réduction ». L'animal est gardé au moins 24 h pour gérer la douleur et surveiller son réveil (présence d'une équipe 24h/24, 7j/7).

RISQUES & COMPLICATIONS

Complications mineures :

- lâchage de points, infection de la plaie, escarres liées au bandage.

Complications majeures :

- retard ou absence de consolidation ; infection de l'os (ostéomyélite) ;
- rupture ou descellement des implants ; boiterie persistante.

SUIVI

Contrôle et retrait des points à 12–15 jours.

Des radiographies à 1 mois et 2 mois vérifient la consolidation de l'os avant d'autoriser la reprise progressive de l'activité.

SOINS APRÈS L'OPÉRATION

- **Repos strict 2 mois** : ni saut, ni course, ni jeu, ni escalier. Espace restreint (cage/parc/petite pièce) ; sorties hygiéniques en laisse courte, 5 min, 3 fois/jour.
- **Calmants** : parfois prescrits pour aider votre animal à rester au repos.
- **Fixateur externe** : des soins réguliers sont à réaliser (vidéo explicative sur le site).

Document d'information destiné aux propriétaires — il ne remplace pas une consultation vétérinaire.

CHV Languedocia — Votre hôpital vétérinaire

470 rue Favre de St Castor, Parc 2000 — 34080 Montpellier · 04 67 75 14 44 · contact@veterinaire-languedocia.com · URGENCES 24h/24 · 7j/7