

ISTITUTO DI RADIOLOGIA ED ECOGRAFIA DERIU	Mod. Preparazione esami TAC e RM con mezzo di contrasto	SRD 17	
		Ed. 03	Rev. 00
		Del 23/04/2025	Pag. 1 di 2

Per l'esecuzione dell'esame è necessario somministrare mezzo di contrasto per via endovenosa. Per evidenziare eventuali fattori di rischio correlati all'impiego di tale farmaco, è necessario eseguire, **massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame**, le seguenti indagini di laboratorio:

- **AZOTEMIA**
- **CREATININEMIA**
- **TRACCIATO ELETTROFORETICO**

❑ **Per i pazienti ALLERGICI seguire il seguente schema:**

➤ pazienti allergici a: ▪ alimenti ▪ farmaci ▪ altro _____ ➤ pazienti asmatici ➤ sofferenti di rinite ➤ congiuntivite ➤ eczema	Il giorno prima dell'esame assumere: ❑ 1 compressa di Tinset 30 mg dopo colazione e dopo cena ❑ 1 compressa di Deltacortene Forte 25 mg. Una ogni 12 ore e una 2 ore prima dell'esame (totale n.3 compresse) 1 ora prima dell'esame assumere: ❑ 1 compressa di Tinset 30 mg
--	---

NB: In caso di conosciuta allergia al mezzo di contrasto è consigliato eseguire l'indagine diagnostica in ambiente Ospedaliero.

NB: Prima di iniziare la terapia cortisonica (DELTACORTENE) consultare il proprio medico di famiglia per accertarsi che non vi siano CONTROINDICAZIONI.

❑ **Per i pazienti DIABETICI con insufficienza renale (GFR inferiore a 60 ml/min)**

Nel caso in cui il paziente sia in terapia ipoglicemizzante con biguanidi ad esempio (**metformina**), la terapia dovrà essere sospesa 48h prima e dopo l'esecuzione dell'esame, oppure sostituita con altri farmaci ipoglicemizzanti.

❑ **Per i pazienti con INSUFFICIENZA RENALE CRONICA, previa consulenza nefrologica, seguire il seguente schema:**

12 ore prima dell'esame	❑ Bere 1,5 litro d'acqua distribuite nelle 12 ore
	❑ Fluimucil 600 mg 2cp
Immediatamente dopo l'esame	❑ Bere 1,5 litro d'acqua distribuite nelle 12 ore dopo l'esame
Entro le 12 ore dopo l'esame	❑ Fluimucil 600 mg 2cp prima dello scadere delle 12 ore
48 ore successive all'esame	❑ Bere 1,5 litro d'acqua
	❑ Fluimucil 600 mg 2cp per 2/die
Si consiglia dosaggio della creatinina basale entro le 72 ore dal contrasto	

❑ **Per i pazienti da sottoporre ad esame TAC delle Coronarie (con BPM maggiore > 65), previa consulenza Cardiologica, valutare eventuale terapia Betabloccante.**

NB: Prima di iniziare qualsiasi terapia elencata consultare il proprio Medico di famiglia al fine di accertarsi che non vi siano ulteriori CONTROINDICAZIONI.

ISTITUTO DI RADIOLOGIA ED ECOGRAFIA DERIU	Mod. Preparazione esami TAC e RM con mezzo di contrasto	SRD 17	
		Ed. 03	Rev. 00
		Del 23/04/2025	Pag. 2 di 2

Il giorno dell'esame presentarsi digiuni da almeno 4 ore e non assumere acqua entro le 2 ore precedenti l'esame.

E' importante che le eventuali terapie in atto vengano continuate anche il giorno dell'esame (ad esclusione dei pazienti diabetici), e si ricorda che è consentito bere la quantità di acqua strettamente necessaria all'assunzione dei farmaci.

Si raccomanda di portare:

- ✓ la prescrizione (impegnativa) del Medico curante;
- ✓ la richiesta del Medico specialista di branca;
- ✓ eventuali indagini diagnostiche precedenti riguardanti l'esame in oggetto;
- ✓ esami del sangue recenti (massimo 30 giorni prima)
- ✓ tessera sanitaria;
- ✓ documento di riconoscimento

L'Esame TAC..... O RMN.....

è prenotato per il _____ alle ore _____

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PREPARAZIONE:

Il sottoscritto/a.....

dichiara di aver eseguito la preparazione secondo lo schema sopra riportato.

Luogo.....,data..... Firma.....