

ISTITUTO DI RADIOLOGIA ED ECOGRAFIA DERIU	Mod. Preparazione esami TAC e RM con mezzo di contrasto	SRD 17	
		Ed. 03	Rev. 02
		Del 20/02/2026	Pag. 1 di 2

Per l'esecuzione dell'esame è necessario somministrare mezzo di contrasto per via endovenosa. Per evidenziare eventuali fattori di rischio correlati all'impiego di tale farmaco, è necessario eseguire, **massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame**, le seguenti indagini di laboratorio:

➤ CREATININEMIA

❑ Per i pazienti **ALLERGICI** seguire il seguente schema:

➤ pazienti allergici a: ▪ alimenti ▪ farmaci ▪ altro _____ ➤ pazienti asmatici ➤ sofferenti di rinite ➤ congiuntivite ➤ eczema	Il giorno prima dell'esame assumere: ❑ 1 compressa di Tinset 30 mg dopo colazione e dopo cena ❑ 1 compressa di Deltacortene Forte 25 mg. Una ogni 12 ore e una 2 ore prima dell'esame (totale n.3 compresse) 1 ora prima dell'esame assumere: ❑ 1 compressa di Tinset 30 mg
--	---

NB: In caso di conosciuta allergia al mezzo di contrasto è consigliato eseguire l'indagine diagnostica in ambiente Ospedaliero.

NB: Prima di iniziare la terapia cortisonica (**DELTACORTENE**) consultare il proprio medico di famiglia per accertarsi che non vi siano **CONTROINDICAZIONI**.

❑ Per i pazienti **DIABETICI, con insufficienza renale e GFR < inferiore a 60 ml/min**

Nel caso in cui il paziente sia in terapia ipoglicemizzante con biguanidi ad esempio (**metformina**), la terapia dovrà essere sospesa 24 ore prima e dopo l'esecuzione dell'esame, oppure sostituita con altri farmaci ipoglicemizzanti.

❑ Per i pazienti con **INSUFFICIENZA RENALE CRONICA o con valori di CREATININEMIA oltre la norma, previa consulenza nefrologica, seguire il seguente schema:**

12 ore prima dell'esame	❑ Bere 1,5 litro d'acqua distribuite nelle 12 ore ❑ Fluimucil 600 mg 1cp
Immediatamente dopo l'esame	❑ Bere 1,5 litro d'acqua distribuite nelle 12 ore dopo l'esame
Entro le 12 ore dopo l'esame	❑ Fluimucil 600 mg 1cp prima dello scadere delle 12 ore
48 ore successive all'esame	❑ Bere almeno 1,5 litro d'acqua

Si consiglia dosaggio della creatinina basale entro le 72 ore dal contrasto

❑ Per i pazienti da sottoporre ad esame TAC delle Coronarie (con BPM maggiore > 65), previa consulenza Cardiologica, valutare eventuale terapia Betabloccante.

NB: Prima di iniziare qualsiasi terapia elencata consultare il proprio Medico di famiglia al fine di accertarsi che non vi siano ulteriori **CONTROINDICAZIONI**.

ISTITUTO DI RADIOLOGIA ED ECOGRAFIA DERIU	Mod. Preparazione esami TAC e RM con mezzo di contrasto	SRD 17	
		Ed. 03	Rev. 02
		Del 20/02/2026	Pag. 2 di 2

Il giorno dell'esame presentarsi digiuni da almeno 4 ore e non assumere acqua entro le 2 ore precedenti l'esame.

E' importante che le eventuali terapie in atto vengano continuate anche il giorno dell'esame (ad esclusione dei pazienti diabetici con insufficienza renale e GFR < inferiore a 60 ml/min che dovranno sospendere l'assunzione della metformina), si ricorda che nelle due ore precedenti l'esame diagnostico è consentito bere la quantità di acqua strettamente necessaria all'assunzione dei farmaci.

Si raccomanda di portare:

- ✓ la prescrizione (impegnativa) del Medico curante;
- ✓ la richiesta del Medico specialista di branca;
- ✓ eventuali indagini diagnostiche precedenti riguardanti l'esame in oggetto;
- ✓ esami del sangue richiesti recenti (massimo 30 giorni prima)
- ✓ tessera sanitaria;
- ✓ documento di riconoscimento

L'Esame TAC..... O RMN.....

è prenotato per il _____ alle ore _____

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PREPARAZIONE:

Il sottoscritto/a.....

dichiara di aver eseguito la preparazione secondo lo schema sopra riportato.

Luogo e data

Firma.....