



Ambulatorio Polispecialistico

MEDISANA Srl

Via Col di Lana 33/a – Gallarate (VA)

Tel 0331-770062

Dir. San. Dr. Paolo Bonfanti


MARZO 2026

UN MINUTO PER LA VITA

PREVENZIONE

Aneurisma Aorta Addominale

Programma attivo unicamente nel mese corrente e limitatamente al numero massimo di accessi disponibili.



***EcocolorDoppler
Aorta
Addominale***


€ 75,00

Ulteriori info nella pagina seguente

Aneurisma Aorta Addominale

L'aorta è la più grande arteria del nostro organismo, parte dal cuore, attraversa il torace e l'addome e fornisce rami arteriosi a tutti gli organi. L'aorta addominale ha, nell'adulto normale, un diametro massimo inferiore a 20 millimetri. Talora può dilatarsi e se la dilatazione supera i 30 millimetri, si parla di aneurisma dell'aorta addominale.

L'Aneurisma dell'aorta addominale è causato dall'indebolimento della sua parete del vaso, dovuto a diversi fattori patologici e all'avanzare dell'età. Questa malattia, nella maggioranza dei casi, non si manifesta clinicamente, pertanto **la maggior parte dei pazienti non sa di esserne affetto**. E' una malattia molto diffusa, colpisce oltre 700.000 persone in Europa (84.000 in Italia) con circa 220.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno (27.000 nel nostro Paese).



Il rischio di sviluppare un aneurisma dell'aorta è del 5-10 per cento negli uomini fra i 65 e i 79 anni e sono maggiormente colpiti i fumatori, quelli che abbiano avuto in famiglia parenti affetti da Aneurisma dell'Aorta Addominale, ed i soggetti affetti da malattie vascolari in altri distretti (coronarie, carotidi, arti inferiori). Il rischio maggiore è quello della rottura; in questo caso si verifica una grave emorragia interna che può essere fatale (Ogni anno in Italia 6.000 persone muoiono per la rottura di un aneurisma dell'aorta addominale).

La diagnosi di aneurisma dell'aorta addominale può essere effettuata in vari modi:

- con la palpazione dell'addome è possibile che il medico avverta un rigonfiamento o una pulsazione e ciò consente al medico, in soggetti non obesi, di sospettare con alta probabilità la presenza di un aneurisma addominale;
- con l'ecografia che è un metodo preciso, non invasivo, che necessita solo di alcuni minuti ed è in grado di misurare il calibro dell'aorta addominale. Attualmente è considerato l'esame di screening dell'aneurisma dell'aorta addominale;
- la migliore definizione della malattia si ottiene con TAC con mezzo di contrasto o l'angio RMN, che sono i metodi migliori per la valutazione pre-chirurgica delle dimensioni e delle caratteristiche dell'aneurisma.

Dopo i sessantacinque anni tutti, e specie i fumatori, dovrebbero sottoporsi ad un'ecografia dell'aorta per individuare in tempo eventuali aneurismi che potrebbero rompersi. Nei casi in cui viene accertata la presenza di Aneurisma, se questo risulta di piccole dimensioni, il paziente viene sottoposto a periodici controlli per seguirne l'evoluzione o, se le dimensioni sono maggiori, quando il diametro raggiunge i 55 millimetri ed il rischio di rottura diventa alto, viene consigliato il trattamento chirurgico o endovascolare.